

Gebrauchsinformation: Information für Patienten

Sildenafil Mylan 25 mg Filmtabletten Sildenafil Mylan 50 mg Filmtabletten Sildenafil Mylan 100 mg Filmtabletten Sildenafil

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Einnahme dieses Arzneimittels beginnen, denn sie enthält wichtige Informationen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Siehe Abschnitt 4.

Was in dieser Packungsbeilage steht

1. Was ist Sildenafil Mylan und wofür wird es angewendet?
2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Sildenafil Mylan beachten?
3. Wie ist Sildenafil Mylan einzunehmen?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Sildenafil Mylan aufzubewahren?
6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

1. Was ist Sildenafil Mylan und wofür wird es angewendet?

Sildenafil Mylan gehört zu einer Gruppe von Arzneimitteln mit der Bezeichnung Phosphodiesterase-Typ-5 (PDE-5)-Hemmer. Es wirkt, indem es bei sexueller Erregung die Entspannung der Blutgefäße in Ihrem Penis unterstützt. Dadurch kann Blut leichter in den Penis fließen. Sildenafil Mylan wird Ihnen nur dann zu einer Erektion verhelfen, wenn Sie sexuell stimuliert werden. Sie sollen Sildenafil Mylan nicht einnehmen, wenn Sie nicht an einer Erektionsstörung (erektiler Dysfunktion) leiden.

Frauen sollen Sildenafil Mylan nicht einnehmen.

Sildenafil Mylan dient zur Behandlung der erektilen Dysfunktion beim erwachsenen Mann, die manchmal auch als Impotenz bezeichnet wird. Diese liegt vor, wenn ein Mann keinen für die sexuelle Aktivität ausreichend harten, aufgerichteten Penis bekommen oder beibehalten kann.

2. Was sollten Sie vor der Einnahme von Sildenafil Mylan beachten?

Sildenafil Mylan darf nicht eingenommen werden,

- wenn Sie allergisch gegen Sildenafil oder einen der in Abschnitt 6. genannten sonstigen Bestandteile dieses Arzneimittels sind
- wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die Nitrate genannt werden, da die Kombination zu einem gefährlichen Abfall Ihres Blutdrucks führen kann. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt, wenn Sie eines dieser Arzneimittel einnehmen, die häufig zur Linderung der Beschwerden bei Angina pectoris (oder „Brustschmerzen“) verordnet werden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker
- wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die als Stickstoffmonoxid-Donatoren bekannt sind, wie Amylnitrit („Poppers“), da auch diese Kombination einen gefährlichen Abfall Ihres Blutdrucks bewirken kann
- wenn Sie eine schwere Herz- oder Lebererkrankung haben

- wenn Sie vor Kurzem einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt hatten, oder wenn Sie einen niedrigen Blutdruck haben
- wenn Sie bestimmte seltene erbliche Augenerkrankungen haben (wie *Retinitis pigmentosa*)
- wenn Sie bereits einmal einen Sehverlust aufgrund einer nicht arteriitischen anterioren ischämischen Optikusneuropathie (NAION) hatten.

Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, bevor Sie Sildenafil Mylan einnehmen,

- wenn Sie eine Sichelzellenanämie (Veränderung der roten Blutkörperchen), Leukämie (Blutkrebs) oder multiples Myelom (Knochenmarkkrebs) haben
- wenn Sie eine Deformation Ihres Penis oder Peyronie-Krankheit haben
- wenn Sie Herzprobleme haben. Ihr Arzt soll in diesem Fall sorgfältig überprüfen, ob Ihr Herz der zusätzlichen Beanspruchung durch Geschlechtsverkehr gewachsen ist
- wenn Sie zurzeit ein Magengeschwür haben, oder wenn eine Störung der Blutgerinnung (wie z. B. Hämophilie) vorliegt.

Sie dürfen Sildenafil Mylan nicht einnehmen, wenn Sie keine Erektionsstörung haben.

Sie dürfen Sildenafil Mylan nicht einnehmen, wenn Sie eine Frau sind.

Kinder und Jugendliche

Sildenafil Mylan darf von Personen unter 18 Jahren nicht eingenommen werden.

Besondere Überlegungen für Patienten mit Nieren- oder Lebererkrankungen

Sie sollten Ihren Arzt informieren, falls Sie eine Funktionsstörung der Nieren oder der Leber haben. Ihr Arzt wird entscheiden, ob für Sie eine niedrigere Dosierung nötig ist.

Einnahme von Sildenafil Mylan zusammen mit anderen Arzneimitteln

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen, kürzlich andere Arzneimittel eingenommen haben oder beabsichtigen, andere Arzneimittel einzunehmen.

Sildenafil Mylan Tabletten und manche Arzneimittel können sich gegenseitig beeinflussen, insbesondere solche, die zur Behandlung von Brustschmerzen eingesetzt werden. Bei einem medizinischen Notfall sollten Sie dem medizinischen Fachpersonal, das Sie behandelt, sagen, dass Sie Sildenafil Mylan eingenommen haben und wann Sie es eingenommen haben. Nehmen Sie Sildenafil Mylan nicht während der Behandlung mit anderen Arzneimitteln ein, wenn Ihr Arzt Ihnen nicht ausdrücklich sagt, dass Sie dies tun können.

Sie dürfen Sildenafil Mylan nicht einnehmen, wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die Nitrate genannt werden, oder Nicorandil (ein Nitrat-ähnliches Arzneimittel), da die Kombination dieser Arzneimittel zu einem gefährlichen Abfall Ihres Blutdrucks führen kann. Sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie eines dieser Arzneimittel einnehmen, die häufig zur Linderung der Beschwerden bei Angina pectoris (oder „Brustschmerzen“) verordnet werden.

Sie dürfen Sildenafil Mylan nicht einnehmen, wenn Sie Arzneimittel einnehmen, die als Stickstoffmonoxid-Donatoren bekannt sind, wie Amylnitrit („Poppers“), da auch diese Kombination zu einem gefährlichen Abfall Ihres Blutdrucks führen kann.

Wenn Sie als Protease-Hemmstoffe bekannte Arzneimittel einnehmen, wie sie zur Behandlung der HIV-Infektion eingesetzt werden, wird Ihr Arzt die Behandlung möglicherweise mit der niedrigsten Sildenafil Mylan-Dosis (25 mg) beginnen.

Manche Arzneimittel, wie Ketoconazol, Itraconazol, Erythromycin und Cimetidin können die Wirkung von Sildenafil verstärken, während andere Arzneimittel, wie Rifampicin seine Wirkung abschwächen können.

Bei einigen Patienten, die Alphablocker zur Behandlung von Bluthochdruck oder Prostatavergrößerung einnehmen, kann es zu Schwindelgefühl und Benommenheit kommen, die durch einen zu niedrigen Blutdruck beim raschen Aufsetzen oder Aufstehen verursacht sein können. Einige Patienten hatten derartige Beschwerden, wenn sie Sildenafil zusammen mit Alphablockern verwendeten. Zumeist geschieht dies innerhalb von 4 Stunden nach der Einnahme von Sildenafil Mylan. Um die Wahrscheinlichkeit zu verringern, dass derartige Beschwerden bei Ihnen auftreten, sollten Sie Ihren Alphablocker in einer regelmäßigen Tagesdosis einnehmen, bevor Sie Sildenafil Mylan nehmen. Ihr Arzt wird Ihnen in einem solchen Fall möglicherweise eine niedrigere Anfangsdosis (25 mg) Sildenafil Mylan verordnen.

Sie dürfen Sildenafil Mylan nicht gleichzeitig mit anderen oral oder lokal angewendeten Behandlungen der erektilen Dysfunktion anwenden, einschließlich jener, die als PDE5-Hemmer bekannt sind (wie Tadalafil).

Sie sollten Sildenafil Mylan nicht zusammen mit Behandlungen von pulmonal-arterieller Hypertonie (PAH) anwenden, die Sildenafil oder Bosentan enthalten.

Einnahme von Sildenafil Mylan zusammen mit Nahrungsmitteln, Getränken und Alkohol

Sildenafil Mylan kann mit oder ohne Nahrung eingenommen werden (siehe Abschnitt 3 „Wie ist Sildenafil Mylan einzunehmen?“). Sie werden aber möglicherweise feststellen, dass es länger dauert, bis Sildenafil Mylan wirkt, wenn Sie es mit einer reichhaltigen Mahlzeit einnehmen.

Alkoholgenuss kann vorübergehend die Fähigkeit herabsetzen, eine Erektion zu erreichen. Um den bestmöglichen Nutzen von Ihrem Arzneimittel zu erhalten, sollten Sie keine übermäßigen Mengen Alkohol trinken, bevor Sie Sildenafil Mylan einnehmen.

Sie sollten während der Einnahme von Sildenafil Mylan keinen Grapefruitsaft trinken, da dies die Wirkung dieses Arzneimittels verstärken kann.

Schwangerschaft, Stillzeit und Zeugungs-/Gebärfähigkeit

Sildenafil Mylan ist nicht zur Anwendung bei Frauen bestimmt.

Verkehrstüchtigkeit und Fähigkeit zum Bedienen von Maschinen

Sildenafil Mylan kann Schwindel verursachen und das Sehvermögen beeinflussen. Achten Sie darauf, wie Sie auf die Einnahme von Sildenafil Mylan reagieren, bevor Sie Auto fahren oder Maschinen bedienen.

3. Wie ist Sildenafil Mylan einzunehmen?

Nehmen Sie dieses Arzneimittel immer genau nach Absprache mit Ihrem Arzt oder Apotheker ein. Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

Die empfohlene Anfangsdosis beträgt 50 mg.

Nehmen Sie Sildenafil Mylan nicht häufiger als einmal am Tag ein.

Sie sollten Sildenafil Mylan ungefähr 1 Stunde vor dem beabsichtigten Geschlechtsverkehr einnehmen. Schlucken Sie die Tablette unzerkaut und trinken Sie dazu ein Glas Wasser.

Bitte sprechen Sie mit Ihrem Arzt oder Apotheker, wenn Sie den Eindruck haben, dass die Wirkung von Sildenafil Mylan zu stark oder zu schwach ist. Sildenafil Mylan wird Ihnen nur dann zu einer Erektion verhelfen, wenn Sie sexuell stimuliert werden. Der Zeitraum bis zum Wirkungseintritt von Sildenafil Mylan ist von Patient zu Patient verschieden, er liegt üblicherweise bei ½ - 1 Stunde. Sie werden möglicherweise feststellen, dass es länger dauert, bis Sildenafil Mylan wirkt, wenn Sie es mit einer reichhaltigen Mahlzeit einnehmen.

Sie sollten Ihren Arzt unterrichten, falls Sildenafil Mylan bei Ihnen keine Erektion auslöst oder die Erektion nicht ausreichend lange anhält, um den Geschlechtsverkehr zu vollenden.

Wenn Sie eine größere Menge von Sildenafil Mylan eingenommen haben, als Sie sollten

Nebenwirkungen können häufiger auftreten und schwerwiegender sein, z. B. Kopfschmerzen, anfallsartige Rötung im Gesicht, Schwindel, Verdauungsstörung, verstopfte Nase und Wirkungen auf das Sehvermögen (einschließlich von Lichtempfindlichkeit, verschwommenem Sehen oder eingeschränkter Sehschärfe). Dosen von mehr als 100 mg erhöhen die Wirksamkeit nicht.

Nehmen Sie keine höhere Dosis als diejenige ein, die Ihnen Ihr Arzt verordnet hat.

Wenn Sie eine größere Menge von Sildenafil Mylan eingenommen haben, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie weitere Fragen zur Einnahme dieses Arzneimittels haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann auch dieses Arzneimittel Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen. Die Nebenwirkungen, die in Verbindung mit Sildenafil Mylan beschrieben werden, sind zumeist leicht bis mäßig und von kurzer Dauer.

Wenn Sie eine der folgenden schweren Nebenwirkungen feststellen, brechen Sie die Einnahme von Sildenafil Mylan ab und suchen Sie sofort ärztliche Hilfe:

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Personen betreffen):

- Eine allergische Reaktion
Symptome umfassen plötzlich pfeifende Atmung, Atembeschwerden oder Schwindel, Schwellung von Augenlidern, Gesicht, Lippen oder Rachen.
- Schmerzen in der Brust
Wenn dies während oder nach dem Geschlechtsverkehr auftritt, begeben Sie sich in eine halb sitzende Position und versuchen Sie, sich zu entspannen.
Verwenden Sie keine Nitrate, um Ihre Brustschmerzen zu lindern.

Selten (kann bis zu 1 von 1.000 Personen betreffen):

- Schlaganfall oder „Mini-Schlaganfall“ (transitorische ischämische Attacke)
Symptome umfassen Taubheitsgefühl oder Schwäche der Arme oder Beine, Kopfschmerzen, Schwindel und Verwirrtheit, Sehstörung, Schluckbeschwerden, Probleme beim Sprechen und Sprachverlust.
- Herzanfall

Symptome umfassen ein drückendes Gefühl, Brustschmerzen, die in Kiefer, Nacken, Arme und Rücken ausstrahlen, Kurzatmigkeit, Schwächegefühl und/oder Benommenheit, Schwitzen, Schwäche.

- Ein sehr schneller oder unüblicher Herzschlag.
- Anhaltende und manchmal schmerzhafte Erektion
Wenn Sie eine Erektion haben, die länger als 4 Stunden anhält, müssen Sie sich sofort an einen Arzt wenden.
- Blutung aus dem Penis.
- Ein plötzlich eingeschränktes oder ausfallendes Sehvermögen, was durch eine Blutung an der Rückseite des Auges, Verstopfung von Blutgefäßen im Auge verursacht werden kann, oder erhöhter Augeninnendruck, der zu einem allmählichen Sehverlust führen kann.
- Schwere Hautreaktionen
Mögliche Symptome sind starkes Abschälen und Anschwellen der Haut, Blasenbildung an Mund, Genitalien und um die Augen, Fieber.
- Krampfanfälle oder Konvulsionen.
- Instabile Angina pectoris (eine Herzerkrankung) mit Brustschmerzen im Ruhezustand.

Zusätzliche Nebenwirkungen, die nach dem Inverkehrbringen gemeldet wurden, umfassen plötzlichen Tod. Die meisten, jedoch nicht alle Männer, bei denen dies eintrat, hatten Herzprobleme, bevor Sie dieses Arzneimittel einnahmen. Es ist nicht möglich, zu bestimmen, ob dies in direktem Zusammenhang mit Sildenafil stand.

Weitere gemeldete Nebenwirkungen:

Sehr häufig (kann mehr als 1 von 10 Personen betreffen):

- Kopfschmerzen.

Häufig (kann bis zu 1 von 10 Personen betreffen):

- Übelkeit, Gesichtsrötung, Hitzewallungen (Symptome umfassen ein plötzliches Wärmegefühl in Ihrem Oberkörper), Verdauungsstörungen, Beeinflussung des Sehvermögens (einschließlich Störungen des Farbsehens wie Blausehen, verschwommenes Sehen, Sehstörung), verstopfte Nase und Schwindel.

Gelegentlich (kann bis zu 1 von 100 Personen betreffen):

- Erbrechen, Hautausschläge, blutunterlaufene/gerötete Augen, Augenschmerzen, Sehen von Lichtblitzen, verstärktes Helligkeitsempfinden, Lichtempfindlichkeit, tränende Augen, Jucken der Augen und Krusten an den Augenlidern, trockene Augen, Herzklopfen, Herzhagen, hoher Blutdruck, niedriger Blutdruck, Muskelschmerzen, Schläfrigkeit, vermindertes Tastgefühl, Drehschwindel, Ohrensausen, Mundtrockenheit, verstopfte Nebenhöhlen, Entzündung der Nasenschleimhaut (Symptome umfassen laufende Nase, Niesen und verstopfte Nase), Schmerzen im Oberbauch, gastroösophageale Refluxkrankheit (Symptome umfassen Sodbrennen), Vorhandensein von Blut im Harn, Schmerzen in den Armen oder Beinen, Nasenbluten, Hitzeempfinden und Müdigkeit.

Selten (kann bis zu 1 von 1.000 Personen betreffen):

- Ohnmacht, Gefühl von Beklemmung im Rachen, Taubheitsgefühl im Mund, Doppelsehen, Schwellung von Auge oder Augenlid, verminderte Sehschärfe, anormales Gefühl im Auge, kleine Partikel oder Punkte in Ihrem Gesichtsfeld, Sehen von Halos um Lichter, Erweiterung der Pupille des Auges, Verfärbung des Augenweißes, Augenreizung, Vorhandensein von Blut im Sperma, trockene Nase, Schwellung der Nasenschleimhaut, Reizbarkeit, plötzliche Schwerhörigkeit oder Taubheit.

Meldung von Nebenwirkungen

Wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker. Dies gilt auch für Nebenwirkungen, die nicht in dieser Packungsbeilage angegeben sind. Sie können Nebenwirkungen auch direkt anzeigen über:

Föderalagentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte

Abteilung Vigilanz

EUROSTATION II

Victor Hortaplein, 40/40

B-1060 BRÜSSEL

Website: www.fagg-afmps.be

E-Mail: patientinfo@fagg-afmps.be

Indem Sie Nebenwirkungen melden, können Sie dazu beitragen, dass mehr Informationen über die Sicherheit dieses Arzneimittels zur Verfügung gestellt werden.

5. Wie ist Sildenafil Mylan aufzubewahren?

- Bewahren Sie dieses Arzneimittel für Kinder unzugänglich auf.
- Sie dürfen dieses Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton und der Blisterpackung angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des angegebenen Monats.
- Für dieses Arzneimittel sind keine besonderen Lagerungsbedingungen erforderlich
- Entsorgen Sie Arzneimittel nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall. Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr verwenden. Sie tragen damit zum Schutz der Umwelt bei.

6. Inhalt der Packung und weitere Informationen

Was Sildenafil Mylan enthält

- Der Wirkstoff ist: Sildenafil. Jede Tablette enthält 25 mg, 50 mg oder 100 mg Sildenafil (als Sildenafil-Citrat).
- Die sonstigen Bestandteile sind:
 - Tablettenkern: mikrokristalline Cellulose, wasserfreies Calciumhydrogenphosphat, Croscarmellose-Natrium, Magnesiumstearat.
 - Filmüberzug: Hypromellose (E464), Titandioxid (E171), Indigocarmin Aluminiumsalz (E132), Triacetin.

Wie Sildenafil Mylan aussieht und Inhalt der Packung

Die 25-mg-Tabletten sind blaue, runde, bikonvexe Filmtabletten mit der Prägung „M“ auf einer Seite und „SL“ über „25“ auf der anderen Seite.

Die 50-mg-Tabletten sind blaue, runde, bikonvexe Filmtabletten mit der Prägung „M“ auf einer Seite und „SL“ über „50“ auf der anderen Seite.

Die 100-mg-Tabletten sind blaue, runde, bikonvexe Filmtabletten mit der Prägung „M“ auf einer Seite und „SL“ über „100“ auf der anderen Seite.

Sildenafil Mylan 25 mg Filmtabletten sind in Blisterpackungen mit 1, 2, 4, 8 oder 12 Tabletten.

Sildenafil Mylan 50 mg und 100 mg Filmtabletten sind in Blisterpackungen mit 1, 2, 4, 8, 12, 24 oder 36 Tabletten.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

Pharmazeutischer Unternehmer:

Mylan bvba/sprl
Terhulpesteenweg 6A
B-1560 Hoeilaart

Hersteller:

Gerard Laboratories
35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road
Dublin 13
Irland

Mylan Hungary Kft
H-2900 Komárom
Mylan utca 1
Ungarn

Generics [UK] Ltd
Station Close
Pottersbar
Herts
EN6 1TL
Vereinigtes Königreich

Zulassungsnummern

25 mg: BE383257
50 mg: BE383266
100 mg: BE383275

Art der Abgabe

Verschreibungspflichtig.

Dieses Arzneimittel ist in den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraumes (EWR) unter den folgenden Bezeichnungen zugelassen:

Österreich: Sildenafil Arcana 25 mg, 50 mg, 100 mg Filmtabletten
Belgien: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg Filmtabletten
Bulgarien: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg film-coated tablets
Tschechische Republik: Sildenafil Mylan 50 mg, 100 mg potahované tablety
Dänemark: Sildenafil Mylan
Finnland: Sildenafil Mylan 50 mg ja 100 mg kalvopäällysteiset tabletit
Frankreich: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimés pelliculés
Deutschland: duraviril 25 mg, 50 mg, 100 mg Filmtabletten
Griechenland: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg film-coated tablets
Ungarn: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg filmtabletta

Island: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg Filmhúðaðar töflur
Irland: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg film-coated tablets
Italien: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg compresse rivestite con film
Luxemburg: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimés pelliculés
Norwegen: Sildenafil Mylan 50 mg, 100 mg tabletter, filmdrasjerte
Polen: Sildenafil Mylan, 25 mg, 50 mg, 100 mg, Tabletki powlekane
Portugal: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimido revestido por película
Rumänien: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimate filmate
Slowakei: Sildenafil Mylan 50 mg / 100 mg Filmom obalené tablety
Slowenien: Sildenafil Mylan 50 mg, 100 mg filmsko obložene tablete
Spanien: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg comprimidos recubiertos con película
Schweden: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg filmdragerade tabletter
Niederlande: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg, filmomhulde tabletten
Vereinigtes Königreich: Sildenafil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg film-coated tablets

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 05/2016.