

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle

Fluconazol Orion 150 mg kovat kapselit flukonatsoli

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Ota tästä lääketä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai apteekkienkilokunta on neuvonut sinulle.

- Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä myöhemmin.
- Kysy tarvittaessa aptekista lisätietoja ja neuvoja.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Ks. kohta 4.
- Käännny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:

1. Mitä Fluconazol Orion on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Fluconazol Orion -valmistetta
3. Miten Fluconazol Orion -valmistetta otetaan
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. Fluconazol Orion -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä Fluconazol Orion on ja mihin sitä käytetään

Fluconazol Orion kuuluu sienilääkkeiden lääkeryhmään. Vaikuttava aine on flukonatsoli.

Ilman lääkemääräystä Fluconazol Orion 150 mg -valmistetta käytetään hiivasienen aiheuttaman emätintulehduksen (*Candida*-vaginiitin) hoitoon naisille, joilla on aikaisemmin ollut lääkärin toteama hiivasienitulehdus. Sen oireita ovat mm. kutina ja kirvely emättimessä ja ulkosynnyttimissä.

Käännny lääkärin puoleen, ellei olosi parane kolmen päivän jälkeen tai se huononee.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin otat Fluconazol Orion -valmistetta

Älä ota Fluconazol Orion -valmistetta

- jos olet allerginen flukonatsolille, jollekin samansukuiselle lääkeaineelle (atsoliyhdisteet) tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6). Oireita voivat olla kutina, ihmipunoitus tai hengitysvaikeudet.
- jos käytät astemitsolia, terfenadiinia (antihistamiineja allergioiden hoitoon)
- jos käytät sisapridia (mahavaivojen hoitoon)
- jos käytät pimotsidia (psykkisen sairauden hoitoon)
- jos käytät kinidiiniä (sydämen rytmihäiriöiden hoitoon)
- jos käytät erytromysiiniä (antibiootti infektioiden hoitoon).

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin otat Fluconazol Orion -valmistetta

- jos olet alle 16-vuotias tai yli 50-vuotias
- jos sinulla on emätintulehduksen oireita ensimmäistä kertaa
- jos sinulla on ollut hiivasienitulehdus useammin kuin kahdesti kuluneiden kuuden kuukauden aikana

- jos veresi kalium-, kalsium- tai magnesiumpitoisuus on poikkeava
- jos sinulla on jokin sydänsairaus, mukaan lukien sydämen rytmihäiriöt
- jos sinulla on maksan tai munuaisten toimintahäiriötä
- jos olet (tai kumppani on) altistunut sukupuoliteitse tarttuvalle taudille
- jos olet epävarma oireiden syystä tai sinulla on kuumetta tai alavatsakipua, epänormaalialtia tai epäsäännöllistä veristä emätiinvuotoa, ärtynoisyyttä, sukupuolielinten haavoja tai rakkuloita tai polttelua virtsatessa
- jos sinulle ilmaantuu lisämunuaisten vajaatoiminnan oireita (jatkuva tai pitkäkestoinen väsymys, lihasheikkous, ruokahaluttomuus, painonlasku, vatsakipu). Lisämunuaisten vajaatoiminnassa lisämunuaiset eivät tuota riittävästi tiettyjä steroidihormoneja, kuten kortisolia
- jos sieni-infekcio ei parane, koska muunlainen sienilääkehoito voi olla tarpeen
- jos sinulle on joskus kehittynyt vaikea-asteista ihottumaa tai ihmisen kuoriutumista, rakkuloita ja/tai suun haavaumia Fluconazol Orion -valmisteen ottamisen jälkeen
- jos käytät tiettyjä muita lääkkeitä (ks. kohta *Muut lääkevalmisteet ja Fluconazol Orion*).

Fluconazol Orion -valmisteen käytössä on raportoitu vakavia ihoreaktioita, mukaan lukien yleisoireista eosinofilistä oireyhtymää (DRESS). Jos havaitset näihin vakaviin ihoreaktioihin liittyviä oireita, jotka kuvataan kohdassa 4, lopeta Fluconazol Orion -valmisteen ottaminen ja hakeudu heti lääkäriin.

Muut lääkevalmisteet ja Fluconazol Orion

Kerro lääkärille tai apteekkikenkilökunnalle, jos parhaillaan otat, olet äskettäin ottanut tai saatat ottaa muita lääkkeitä.

Älä otta Fluconazol Orion -kapseleita samanaikaisesti seuraavien lääkeaineiden kanssa: astemitsoli, terfenadiini (antihistamiineja allergioiden hoitoon), sisapridi (mahavaivojen hoitoon), pimotsidi (psykkisten sairauksien hoitoon), kinidiini (sydämen rytmihäiriöiden hoitoon), erytromysiini (antibiootti infektioiden hoitoon).

Jos käytät jotakin seuraavista lääkkeistä, keskustele lääkärin tai apteekkikenkilökunnan kanssa ennen kuin otat Fluconazol Orion -kapseleita. Mainituilla lääkkeillä voi olla yhteisvaikutuksia tämän lääkevalmisteen kanssa:

- amiodaroni (sydämen rytmihäiriöiden hoitoon)
- rifampisiini, rifabutiini (antibiootteja infektioiden hoitoon)
- alfentaniili, fentanyl (anestesia-aineita)
- amitriptyliini, nortriptyliini (masennuslääkkeitä)
- amfoterisiini B, vorikonatsoli (sienilääkkeitä)
- verenohennuslääke verisuonitukosten estämiseen (indanedioni, varfariini tai samankaltaiset lääkkeet)
- bentsodiatsepiinit (midatsolaami, triatsolaami tai samankaltaiset lääkkeet), joita käytetään unilääkkeenä tai ahdistuneisuuden hoitoon
- karbamatsepiini, fenytoini (epilepsian hoitoon)
- nifedipiini, isradipiini, amlodipiini, verapamiili, felodipiini ja losartaani (verenpainetaudin eli korkean verenpaineen hoitoon)
- olaparidi (munasarjasyövän hoitoon)
- siklosporiini, everolimuusi, sirolimuusi, takrolimuusi (elinsiirteen hylkimisen estämiseen)
- syklofosfamidi, vinka-alkaloidit (vinkristiini, vinblastiini tai samankaltaiset lääkkeet) syövän hoitoon
- halofantriini (malarialääke)
- statiinit (atorvastatiini, simvastatiini ja fluvastatiini tai samankaltaiset lääkkeet) veren korkeiden kolesterolipitoisuksien pienentämiseen

- metadoni (kipulääke)
- selekoksibi, flurbiprofeeni, naprokseeni, ibuprofeeni, lornoksikaami, meloksikaami, diklofenaakki (tulehduskipulääkkeitä eli NSAIDeja)
- ehkäisytabletit
- prednisoni (steroidi)
- tsidovudiini (tunnetaan myös nimellä AZT) tai sakinaviiri (HIV-lääke)
- diabeteslääkkeet, kuten klooripropamidi, glibenklamidi, glipitsidi tai tolbutamidi
- teofylliini (astmalääke)
- tofasitinibi (nivelreumalääke)
- tretinoiini (suuriannoksinen A-vitamiinihoito)
- ivakaftori (kystisen fibroosin hoitoon)
- hydroklooritiatsidi (nesteenpoistolääke)
- ibrutinbi (verisyyvän hoitoon).

Ehkäisyvalmisteita voit käyttää samanaikaisesti tämän yhden, kerta-annoksenä otettavan Fluconazol Orion-kapselin kanssa ilman, että siitä tarvitsee keskustella lääkärin kanssa.

Muista mainita Fluconazol Orion-kapselin käytöstä seuraavien lääkärissä käyntien yhteydessä.

Fluconazol Orion ruuan ja juoman kanssa

Juo lasillinen vettä tai muuta juomaa, kun otat kapselin. Voit ottaa lääkkeen aterian yhteydessä tai tyhjään mahaan.

Raskaus, imetyks ja hedelmällisyys

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Älä ota Fluconazol Orion -valmistetta, jos olet raskaana, epäilet olevasi raskaana, yrität tulla raskaaksi tai imetät, ellei lääkäriksi ole sitä erityisesti määränyt.

Flukonatsolin käyttö ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana voi lisätä keskenmenon riskiä.

Flukonatsolin käyttö pieninä annoksina ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana voi lisätä hieman riskiä, että syntyyvällä vauvalla on synnynnäisiä luiden ja/tai lihasten poikkeavuuksia.

Imetystä voi jatkaa Fluconazol Orion-kapselin kerta-annoksen oton jälkeen (150 mg:n kerta-annos). Pitkääkaisemman hoidon (toistuvan annostelun) yhteydessä imetystä ei saa jatkaa.

Ajaminen ja koneiden käyttö

Ajaessa ja koneita käytettäessä on otettava huomioon, että huimausta tai kouristuskohtauksia saattaa esiintyä satunnaisesti.

Fluconazol Orion sisältää laktoosia

Tämä lääke sisältää laktoosia (monohydraattina), 138 mg/kapseli. Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkkeen ottamista.

Muut apuaineet

Tämä lääke sisältää alle 1 mmol (23 mg) natriumia per kapseli eli sen voidaan sanoa olevan "natriumiton".

3. Miten Fluconazol Orion -valmistetta otetaan

Ota tästä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuten lääkäri on määränyt tai apteekkienkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.

Niele kapseli kokonaisena vesilasillisen kanssa.

Aikuiset

150 mg kerta-annoksenä.

Kuinka nopeasti hoito vaikuttaa?

Emättimen hiivatulehduksen oireet alkavat helpottua muutaman päivän kuluessa – osa naisista huomaa oireiden helpottavan ensimmäisenä hoitopäivänä. Jos oireet eivät helpotu kolmessa päivässä, ota yhteyttä lääkäriin.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkienhenkilökunnan puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

Jos havaitset jonkin seuraavista oireista, lopeta Fluconazol Orion -valmisteen ottaminen ja hakeudu heti lääkäriin:

- laaja-alainen ihottuma, kuume ja suurentuneet imusolmukkeet (DRESS-oireyhtymä eli lääkeyliherkkyysoireyhtymä).

Pienelle osalle potilaista ilmaantuu **allergisia reaktioita**, mutta vakavat allergiset reaktiot ovat harvinaisia. Jos sinulle ilmaantuu jokin seuraavista oireista, **ota heti yhteys lääkäriin**:

- äkillinen hengityksen vinkuminen, hengitysvaikeudet tai puristuksen tunne rinnassa
- silmälouomien, kasvojen tai hulften turpoaminen
- koko kehon kutina, ihmisen punoitus tai kutisevat punoittavat laikut
- ihottuma
- vaikeat ihoreaktiot, kuten ihottuma, johon liittyy rakkuloita (joita voi esiintyä myös suussa ja kielessä).

Fluconazol Orion -kapseleilla voi olla maksavaikutuksia. Maksahäiriöiden oireita ovat

- väsymys
- ruokahaluttomuus
- oksentelu
- ihmisen silmänvalkuisten kellertyminen (keltaisuus).

Fluconazol Orion -valmisteella voi olla vaikutuksia lisämunuaisiin ja niiden tuottamiin steroidihormonipitoisuksiin. Lisämunuisten vajaatoiminnan oireita ovat:

- väsymys
- lihasheikkous
- ruokahaluttomuus
- painonlasku
- vatsakipu.

Jos tällaisia oireita ilmaantuu, **ota heti yhteys lääkäriin**.

Muita haittavaikutuksia

Yleiset haittavaikutukset (harvemmalli kuin yhdellä 10:stä):

- päänsärky
- vatsakipu, ripuli, pahoinvointi, oksentelu
- maksan toimintakoikeisiin liittyvien verikoetulosten muutokset
- ihottuma.

Melko harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalli kuin yhdellä 100:sta):

- punasolujen määrän väheneminen, joka voi aiheuttaa ihmisen kalpenemista, heikotusta ja hengenahdistusta
- alentunut ruokahalu
- unettomuuksia, uneliaisuuden tunne
- kouristuskohtaukset, huimaus, kihelmöinti, pistely tai puutuminen, makuaistin muutokset
- ummetus, ruoansulatusvaivat, ilmavaivat, suun kuivuminen
- lihaskipu
- maksavaurio sekä ihmisen ja silmävalkuisten keltaisuus
- lääkkeestä johtuva ihottuma (mukaan lukien toistopunoittuma), nokkosihottuma, kutina, lisääntynyt hikoilu
- väsymys, yleinen huonovointisuus, kuume.

Harvinaiset haittavaikutukset (harvemmalli kuin yhdellä 1 000:sta):

- veren valkosolujen (verisolua, jotka vaikuttavat puolustuskykyyn infektioita vastaan) ja verihiuutaleiden (edistävä verenvuodon tyrehtymistä) normaalista pienempi määrä
- ihmisen värin muuttuminen punaiseksi tai purppuranväriiseksi, mikä saattaa aiheuttaa verihiuutaleiden vähyydestä; muiden verisolujen muutokset
- veren pieni kaliumpitoisuus
- korkea veren kolesterolipitoisuus ja rasvapitoisuus
- vapina
- poikkeavuudet sydänsähkökäyrässä (EKG-käyrässä), sydämen syketaajuuden tai rytmin muutokset
- maksan vajaatoiminta
- allergiset reaktiot (jotka voivat toisinaan olla vakavia), mukaan lukien ihmisen laaja-alainen rakkulainen ihottuma ja ihmisen kesiminen, vaikeat ihoreaktiot, huulten tai kasvojen turpoaminen
- hiustenlähtö.

Esiintymistiehsyys tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin):

- yliherkkysreaktio, johon liittyy ihmisen ihottuma, kuume, rauhasten turvotus, tietytyyppisten valkosolujen määrän suureneminen (eosinofilia) ja sisälinten (maksa, keuhkot, sydän, munuaiset ja paksusuoli) tulehdus (yleisoireinen eosinofiilinen oireyhtymä, DRESS).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkienkilokunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisteen turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea

Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri

PL 55

00034 FIMEA

5. Fluconazol Orion -valmisteen säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä käytä tätä läkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämääränsä jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita.

Lääkkeitä ei pidä heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Fluconazol Orion sisältää

- Vaikuttava aine on flukonatsoli. Yksi kova kapseli sisältää 150 mg flukonatsolia.
- Muut aineet: *Kapselin sisältö*. Laktoosimonohydraatti, maissitärkkelys, kolloidinen vedetön piidioksidi, magnesiumstearaatti ja natriumlauryylisulfaatti. *Kapselikuori*. Liivate, titaanidioksidi (E 171) ja keltainen rautaoksi (E 172).

Lääkevalmisten kuvaus ja pakauskoko

Keltainen, läpinäkymätön, kova liivatekapseli, joka sisältää valkoista jauhetta.

Pakauskoko: 1 kapseli.

Myyntiluvan haltija

Orion Corporation

Orionintie 1

02200 Espoo

Valmistaja

Orion Corporation Orion Pharma

Orionintie 1

02200 Espoo

Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 5.2.2021

Bipacksedel: Information till användaren

Fluconazol Orion 150 mg hård kapslar flukonazol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.
- Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Fluconazol Orion är och vad det används för
2. Vad du behöver veta innan du tar Fluconazol Orion
3. Hur du tar Fluconazol Orion
4. Eventuella biverkningar
5. Hur Fluconazol Orion ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad Fluconazol Orion är och vad det används för

Fluconazol Orion tillhör en grupp läkemedel som används mot svampinfektioner. Den aktiva substansen är flukonazol.

Utan läkarordination Fluconazol Orion 150 mg preparatet används för behandling av infektioner i slidan förorsakad av jästsvamp (*Candidavaginit*) för kvinnor som tidigare har haft jästsvampinfektion. Symtom på jästsvampinfektion är bl.a. klåda och sveda i slidan och i de yttre könsorganen.

Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter tre dagar.

2. Vad du behöver veta innan du tar Fluconazol Orion

Ta inte Fluconazol Orion

- om du är allergisk mot flukonazol, ett närbesläktat läkemedel (azolföreningar) eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Symtomen kan vara klåda, hudrodnad eller svårigheter att andas.
- om du tar astemizol, terfenadin (antihistaminer för behandling av allergier)
- om du tar cisaprid (mot magbesvär)
- om du tar pimozid (använts för behandling av psykiska besvär)
- om du tar kinidin (använts för behandling av oregelbunden hjärtrytm)
- om du tar erytromycin (antibiotikum för behandling av infektioner).

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du tar Fluconazol Orion

- om du är under 16 år eller över 50 år
- om du för första gången upplever symtom av infektion i slidan
- om du har haft jästsvampinfektion oftare än två gånger under de senaste 6 månaderna

- om du har onormala halter av kalium, kalcium eller magnesium i blodet
- om du har någon hjärtsjukdom, inklusive hjärtrytmrubbningar
- om du har någon kronisk sjukdom
- om du har lever- eller njurproblem
- om du (eller din partner) har blivit utsatt för en sexuellt överförd sjukdom
- om du är osäker på orsaken för symtomen, du har feber eller värk i nedre delen av magen, onormal eller oregelbunden blodig flytning från slidan, irritation, sår eller blåsor i könsorganen eller sveda vid urinering
- om du utvecklar tecken på binjureinsufficiens, som betyder att binjurarna inte producerar tillräckliga mängder av vissa steroidhormoner såsom kortisol (kronisk eller långvarig trötthet, muskelsvaghet, minskad aptit, viktminskning, buksmärta)
- om svampinfektionen inte blir bättre eftersom du kan behöva få en annan medicin mot svampinfektion
- om du någon gång har fått allvarliga hudutslag eller flagnande hud, blåsor och/eller sår i munnen efter att du tagit Fluconazol Orion
- om du använder vissa andra läkemedel (se avsnitt *Andra läkemedel och Fluconazol Orion*).

Allvarliga hudreaktioner, däribland läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom (DRESS), har rapporterats i samband med behandling med Fluconazol Orion. Sluta att ta Fluconazol Orion och uppsök omedelbart akutmottagning om du får något av de symtom på allvarliga hudreaktioner som beskrivs i avsnitt 4.

Andra läkemedel och Fluconazol Orion

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Använd inte Fluconazol Orion tillsammans med de följande aktiva substansen: astemizol, terfenadin (antihistaminer för behandling av allergi), cisaprid (mot magbesvär), pimozid (använts för behandling av psykiska besvär), kinidin (använts för att behandla oregelbunden hjärtrytm), erytromycin (ett antibiotikum för behandling av infektioner).

Berätta för läkare eller apotekspersonal om du tar någon av följande mediciner. De kan ha sammanverkningar med Fluconazol Orion:

- amiodaron (använts för att behandla oregelbunden hjärtrytm)
- rifampicin, rifabutin (antibiotika mot infektioner)
- alfentanil, fentanyl (använts som bedövningsmedel)
- amitriptylin, nortriptylin (använts för behandling av depression)
- amfotericin B, vorikonazol (mot svampinfektion)
- blodförtunnande läkemedel (indanedion, warfarin eller motsvarande mediciner) för att hindra blodproppar
- bensodiazepiner (midazolam, triazolam eller motsvarande mediciner) som används mot sömnlöshet eller ångest
- karbamazepin, fenytoin (mot epilepsi)
- nifedipin, isradipin, amlodipin, verapamil, felodipin och losartan (mot högt blodtryck)
- olaparid (använts för behandling av äggstockscancer)
- ciklosporin, everolimus, sirolimus, takrolimus (använts för förhindring av avstötning)
- cyklofosfamid, vinka-alkaloider (vincristin, vinblastin eller motsvarande mediciner) som används för att behandla cancer
- halofantrin (mot malaria)
- statiner (atorvastatin, simvastatin och fluvastatin eller motsvarande mediciner) som används för att sänka kolesterolhalten i blodet
- metadon (mot smärta)

- celecoxib, flurbiprofen, naproxen, ibuprofen, lornoxikam, meloxicam, diklofenak (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel, NSAID)
- p-piller
- prednison (steroid)
- zidovudin (även kallat AZT) eller sakvinavir (används vid behandling av HIV)
- läkemedel mot diabetes såsom klorpropamid, glibenklamid, glipizid eller tolbutamid
- teofyllin (mot astma)
- tofacitinib (mot reumatoid artrit)
- tretinoïn (behandling med stora doser av A-vitamin)
- ivacaftor (används vid behandling av cystisk fibros)
- hydroklortiazid (vätskedrivande medel)
- ibrutinib (används för behandling av blodcancer).

Preventmedel kan användas samtidigt med denna Fluconazol Orion kapsel som tas engångdos, utan att konsultera läkaren.

Kom ihåg att tala om att du använder Fluconazol Orion i sam band med följande läkarbesök.

Fluconazol Orion med mat och dryck

Drick ett glass vatten eller annan dricka, när du tar kapseln. Läkemedlet kan tas oberoende av måltid.

Graviditet, amning och fertilitet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du ska inte ta Fluconazol Orion om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn eller ammar, om inte din läkare har sagt åt dig att göra det.

Om flukonazol tas under den första trimestern av graviditeten kan risken för missfall öka. Om flukonazol tas i låga doser under den första trimestern kan risken för att ett barn föds med missbildningar som påverkar skelett och/eller muskler vara något ökad.

Du kan fortsätta amma efter intag av en engångdos om 150 mg Fluconazol Orion. Du bör inte amma om du tar upprepade doser av Fluconazol Orion.

Körförmåga och användning av maskiner

Vid bilköring och när du använder maskiner bör du tänka på att du kan drabbas av yrsel eller krampfall sporadiskt under behandlingen.

Fluconazol Orion innehåller laktos

Denna medicin innehåller laktos (som monohydrat), 138 mg/kapsel. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.

Andra hjälpmännen

Denna medicin innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per kapsel, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.

3. Hur du tar Fluconazol Orion

Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Svälg kapseln hel med ett glas vatten.

Vuxna

150 mg som engångsdos.

Hur snabbt börjar behandlingen verka?

Inom några dagar bör symtomen av svampinfektion i slidan börja försvinna – vissa kvinnor upplever förbättring inom en dag. Om dina symtom inte blir bättre inom tre dagar bör du kontakta läkare.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta att ta Fluconazol Orion och uppsök omedelbart akutmottagning om du upplever något av följande symptom:

- utbredda utslag, feber eller svullna lymfkörtlar (DRESS eller överkänslighetsreaktion mot läkemedel).

Några personer utvecklar **allergiska reaktioner**, även om det är sällsynt med allvarliga allergiska reaktioner. Om du får några av följande symptom **ska du genast kontakta läkare**:

- plötslig pipande andning, svårigheter att andas eller en trång känsla i bröstet
- svullnad i ögonlock, ansikte eller läppar
- klåda över hela kroppen, hudrodnad eller kliande, röda fläckar
- hudutslag
- svåra hudreaktioner, t.ex. ett utslag med blåsbildning (detta kan påverka mun och tunga).

Fluconazol Orion kan påverka din lever. Tecken på leverpåverkan inkluderar:

- trötthet
- aptitlöshet
- kräkningar
- gulaktig hud eller gulaktiga ögonvitor (gulsot).

Fluconazol Orion kan påverka dina binjurar och de nivåer av steroidhormoner som produceras. Tecken på detta inkluderar:

- trötthet
- muskelsvaghet
- minskad aptit
- viktminskning
- buksmärta.

Om något av detta inträffar, **kontakta läkare omedelbart**.

Andra biverkningar

Vanliga biverkningar (hos färre än en av 10):

- huvudvärk
- magknip, diarré, illamående, kräkningar
- förhöjda levervärden vid blodtester

- hudutslag.

Mindre vanliga biverkningar (hos färre än en av 100):

- minskad mängd röda blodkroppar vilket kan leda till blek hud och orsaka svaghet eller andfåddhet
- minskad aptit
- sömnlöshet, dåsighet
- krampanfall, yrsel, snurrande känsla, myrkrypningar, stickningar eller domningar, smakförändringar
- förstopning, matsmältningsbesvär, gasspänningar, muntorrhet
- muskelsmärta
- leverkada och gulfärgning av hud och ögonvitor (gulsot)
- hudutslag orsakad av läkemedlet (inklusive fixt läkemedelsutslag), nässelutslag, klåda, svettningar
- trötthet, allmän sjukdomskänsla, feber.

Sällsynta biverkningar (hos färre än en av 1 000):

- minskat antal vita blodkroppar (som hjälper till att försvara kroppen mot infektioner) och minskat antal blodplättar (blodkroppar som hjälper till att stoppa blödningar)
- röd eller lila missfärgning av huden som kan orsakas av minskat antal blodplättar eller andra förändringar i blodet
- sänkt halt av kalium i blodet
- förhöjda blodkolesterol- och blodfettvärden
- skakningar
- onormalt EKG, förändringar i puls eller hjärtrytm
- leversvikt
- allergiska reaktioner (ibland allvarliga), däribland utbredda utslag med blåsbildning och flagande hud, svåra hudreaktioner och svullnad av läppar eller ansikte
- hårväfall.

Har rapporterats (förekomma hos ett okänt antal användare):

- överkänslighetsreaktion med hudutslag, feber, svullna, körtlar, ökad mängd av en typ av vita blodkroppar (eosinofili) och inflammation i inre organ (lever, lungor, hjärta, njurar och tjocktarm) (så kallad ”läkemedelsreaktion med eosinofili och systemiska symtom”, (DRESS)).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

webbplats: www.fimea.fi

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea

Biverkningsregistret

PB 55

00034 FIMEA

5. Hur Fluconazol Orion ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Använts före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Inga särskilda förvaringsanvisningar.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- Den aktiva substansen är flukonazol. En hård kapsel innehåller 150 mg flukonazol.
- Övriga hjälppännen: *Kapselinnehållet*. Laktosmonohydrat, majsstärkelse, kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat och natriumlaurilsulfat. *Kapselhöljet*. Gelatin, titandioxid (E 171) och gul järnoxid (E 172).

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Gul, genomskinlig, hård gelatinkapsel, som innehåller vitt pulver.

Förpackningsstorlek: 1 kapsel.

Innehavare av godkännande för försäljning

Orion Corporation

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Tillverkare

Orion Corporation Orion Pharma

Orionvägen 1

FI-02200 Esbo

Finland

Denna bipacksedel ändrades senast 5.2.2021