

Microgynon dragerade tabletter
levonorgestrel, etinylestradiol

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.
- Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

I denna bipacksedel finns information om följande:

1. Vad Microgynon är och vad det används för	12
2. Vad du behöver veta innan du använder Microgynon	13
Använd inte Microgynon	13
Varningar och försiktighet	13
P-piller och blodproppar	14
P-piller och cancer	15
Andra läkemedel och Microgynon	15
Graviditet och amning	16
Körförmåga och användning av maskiner	16
Microgynon innehåller laktos och sackaros	16
3. Hur du använder Microgynon	16
När och hur skall jag ta tabletterna?	16
När du börjar använda Microgynon tabletter	17
Om du har tagit för stor mängd av Microgynon	18
Du glömmer att ta en tablett	18
Vad måste du göra om du kräks eller har svår diarré	19
Om du vill att menstruationen skall infalla en annan dag	19
Om du vill uppskjuta menstruationen	19
Om du har oregelbundna blödningar	20
Om menstruationen uteblir	20
Om du vill sluta använda Microgynon	20
När skall läkare kontaktas?	20
4. Eventuella biverkningar	20
5. Hur Microgynon ska förvaras	21
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar	21

1. Vad Microgynon är och vad det används för

Microgynon är ett preventivmedel i form av ett kombinationspreparat (kombinations-p-piller). Varje tablett innehåller en liten mängd av två olika kvinnliga könshormon, levonorgestrel (progestin, dvs. gulkroppshormon) och etinylestradiol (östrogen). Microgynon är ett s.k. lågdospreparat med endast små mängder hormon.

Microgynon tabletter används för att förebygga graviditet.

P-piller är ett mycket effektivt preventivmedel. Då de används på rätt sätt (utan att man glömmer ta något piller), är sannolikheten för graviditet mycket liten.

2. Vad du behöver veta innan du använder Microgynon

Använd inte Microgynon

Använd inte kombinations-p-piller om du lider av någon av nedan nämnda sjukdomar eller tillstånd. Informera i så fall läkare innan du börjar använda Microgynon tabletter. Läkaren kan då ordinera dig p-piller av annat slag eller föreslå ett antikonceptionellt medel av annan typ (icke hormonellt preventivmedel).

- Om du har eller har haft en sjukdom som påverkar blodcirkulationen, framför allt en blodproppsrelaterad sjukdom. Vid blodpropp (trombos) bildas blodproppar inuti blodkärl. Detta tillstånd kan utvecklas i nedre extremiteterna (djup venblodpropp), i lungorna (lungemboli), i hjärtat (hjärtinfarkt) eller på något annat håll i kroppen (se även senare under *P-piller och blodpropp*).
- Om du har eller har haft slaganfall p.g.a. en blodpropp eller ett sprucket blodkärl. Om du har eller har haft symptom som kan vara ett första tecken på hjärtinfarkt (t.ex. belastningsutlöst bröstsmärta) eller slaganfall (t.ex. en TIA-attack, dvs. ett litet, övergående slaganfall).
- Om du har eller har haft migrän som framkallat synsymptom, sluddrigt tal eller en känsla av svaghet eller känslolöshet i en kroppsdel.
- Om du har diabetes som framkallat kärlskador.
- Om du har gulsot eller en allvarlig leversjukdom.
- Om du har eller har haft cancer vars tillväxt påverkas av könshormoner (t.ex. bröstcancer eller cancer i könsorganen).
- Om du har eller har haft levertumör (god- eller elakartad).
- Om du av okänd orsak har blödningar från slidan.
- Om du är gravid eller misstänker graviditet.
- Om du är allergisk mot etinylestradiol eller levonorgestrel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

Om någon av ovannämnda sjukdomar eller tillstånd förvärras eller inträffar för första gången medan du använder tabletterna skall du upphöra med användningen och kontakta din läkare. Under mellantiden skall du tillämpa en icke hormonell preventivmetod. Se även under stycke 3 *Allmänt*.

Barn och ungdomar

Microgynon är endast avsedda för kvinnor som har menstruation.

Åldriga kvinnor

Microgynon är inte avsedda för användning efter menopaus.

Leversvikt

Använd inte Microgynon om du har någon leversjukdom. Se också avsnitt "Använd inte Microgynon" och "Varningar och försiktighet"

Njursvikt

Tala med läkare. Det finns inga data att användningen av Microgynon behövs ändra.

Varningar och försiktighet

Noggrann uppföljning av ditt hälsotillstånd kan behövas om du använder kombinations-p-piller i anslutning till nedan uppräknade sjukdomar eller tillstånd. Du får i detta fall en närmare redogörelse av läkare. Informera alltså läkaren innan du börjar använda Microgynon tabletter om något av det

följande gäller dig:

- du är rökare du är
- diabetiker du har
- övervikt du har högt
- blodtryck
- du har ett klaffel eller en viss typ av rytmrubbning i hjärtat
- du har inflammation i en ven (ytlig flebit) du
- har åderbräck
- en nära släkting till dig har haft blodpropp (trombos), hjärtinfarkt eller slaganfall
- du har migrän du har epilepsi
- du själv eller en nära släkting har eller har haft höga kolesterol- eller triglyceridvärden
- (blodfetter)
- en nära släkting har haft bröstcancer du har
- en sjukdom i levern eller gallblåsan
- du lider av Crohns sjukdom eller ulcerös kolit (kronisk inflammatorisk tarmsjukdom) du
- har systemisk lupus erythematosus (SLE, en sjukdom som framkallar generaliserade hudsymtom)
- du har sicklecellsanemi (sällsynt blodsjukdom i Finland)
- du har hemolytiskt-uremiskt syndrom (HUS, en koagulationsrubbning i blodet som framkallar njurinsufficiens)
- du har en sjukdom som har förvärrats eller debuterats under graviditet eller medan tidigare användning av kombinations-p-piller (t.ex. hörselnedsättning, porfyria (metaboliska sjukdom), herpes gestationis (hudsjukdom), Sydehamns korea (neurologisk sjukdom)).
- du har ärftligt angioödem (anfallsvis uppkommande lokal svullnad i huden) kan tillförda östrogener ge upphov till eller förvärra symtomen på angioödem. Du bör genast kontakta läkare om du får symtom på angioödem, som t.ex. svullnad i ansiktet, tungan och/eller svalget, och/eller svårigheter att svälja eller om du får nässelutslag ihop med andningsvårigheter.
- du har eller har haft leverfläckar (gulbruna pigmenterade hudfläckar framför allt i ansiktet). Undvik i så fall överdriven exposition för solljus och ultraviolett ljus.

Kontakta din läkare om något av ovanstående tillstånd inträffar för första gången, återkommer eller förvärras medan du tar tabletterna.

P-piller och blodproppar

Med blodpropp avses bildning av blodproppar som kan täppa till blodkärl.

En blodpropp (trombos) konstateras stundom i nedre extremiteternas djupt liggande vener (djup venblodpropp). Om blodproppen lämnar kärlet där den har bildats kan den transporteras till lungorna och ge ocklusion av lungartären, s.k. lungemboli. Djup venblodpropp är sällsynt.

Venblodpropp kan uppkomma oavsett om man använder p-piller eller inte. Det kan också uppstå under graviditet. Risken för djup venblodpropp är större hos kvinnor som använder p-piller än hos kvinnor som inte använder p-piller men mindre än under graviditet.

Blodproppar kan i sällsynta fall även bildas i hjärtats kärl (och framkalla en hjärtinfarkt eller i hjärnan (och framkalla ett slaganfall). I enstaka fall konstateras blodproppar i levern, tarmarna, njurarna eller ögonen.

I mycket sällsynta fall kan blodpropp leda till svår, bestående invaliditet eller till döden.

Risken för hjärtinfarkt och slaganfall ökar med åldern. Även rökning medför ökad risk. **Därför rekommenderas rökstopp för dem som använder p-piller, i synnerhet för personer över 35 år.**

Om ditt blodtryck stiger medan du använder p-piller uppmanar läkare dig eventuellt att upphöra med tablettorna.

Risken för djup venblodpropp ökar övergående till följd av immobilisering efter en operation (t.ex. om nedre extremiteten/extremiteterna gipsas eller behandlas med skena). Användning av p-piller kan öka denna risk. Informera i god tid före planerad sjukhusvård eller operation läkaren om att du använder p-piller. Läkaren kanske uppmanar dig att upphöra med p-piller redan flera veckor före operationen eller ifall du måste bli sängliggande. Du får samtidigt besked om när du kan börja med tablettorna igen sedan du kommit på fötter.

Sluta ta dina p-piller och utan dröjsmål kontakta läkare, om du upptäcker möjliga tecken på blodpropp (trombos), såsom:

- svår smärta eller svullnad i ena benet ovanlig
- hosta
- svår bröstsmärta som eventuellt strålar ut i vänster arm andnöd
- ovanlig, kraftig eller långvarig huvudvärk eller migränanfall
- partiell eller total synförlust eller dubbelseende sluddrigt tal
- eller förlust av talförmågan plötsliga förändringar i hörsel-,
- lukt- eller smaksinne yrsel eller svimningsanfall
- en känsla av svaghet eller känslolöshet i någon del av kroppen svåra
- magsmärter
-
- **P-piller och cancer**

Hos kvinnor som använder p-piller har bröstcancer konstaterats i något större omfattning än hos kvinnor i samma ålder vilka inte använder p-piller. Den låga frekvensökningen gällande bröstcancerdiagnoser planar ut efter hand inom loppet av tio år efter det att tablettintaget upphört. Det är inte känt om skillnaden härrör från användning av p-piller. Det är möjligt att kvinnor som använder p-piller är föremål för mer omsorgsfull uppföljning och att bröstcancer därför konstateras tidigare.

I sällsynta fall har godartade och, ännu mer sällan, elakartade levertumörer konstaterats hos p-pilleranvändare. Tumörerna kan framkalla inre blödning. Ta omedelbart kontakt med din läkare om du får svåra magsmärter.

Den största riskfaktorn för livmodercancer är en ihärdig HPV-infektion (human papillomvirusinfektion). Enligt vissa undersökningar kan kombinations-p-pillren i långtidsanvändning öka risken för livmodercancer. Det råder dock ingen samstämmighet om i vilken mån vissa inblandade faktorer (t.ex. papa-provens screeningsfrekvens, det sexuella beteendet och användandet av barriärmetoder) har påverkat observationerna.

Andra läkemedel och Microgynon

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel (även receptfria sådana) eller naturläkemedel. Informera också andra läkare eller tandläkare som föreskriver läkemedel till dig (eller säg till personalen på apoteket) att du använder Microgynon

tabletter. Du får då information om huruvida och hur länge du behöver ett kompletterande preventivmedel.

Vissa läkemedel kan undertrycka effekten av p-piller. Sådana är bl.a. antiepileptika (t.ex. primidon, fenytoin, barbiturater, karbamazepin, oxkarbazepin, topiramid, felbamat), läkemedel mot tuberkulos (t.ex. rifampicin, rifabutin) och läkemedel mot HIV (t.ex. ritonavir, nevirapin) samt vissa antibiotika som används vid andra infektionssjukdomar (t.ex. penicillin, tetracykliner, griseofulvin).

Samtidig användning av naturläkemedel som innehåller johannesört (*Hypericum perforatum*) kan försvaga effekten av Microgynon. Om du använder något preparat som innehåller johannesört ska du diskutera om det med läkare. Microgynon kan också påverka effekten av andra läkemedel (t.ex. ciklosporin, lamotrigin, tizanidin).

Samtidigt användning av troleandomycin (antibiotikum) och Microgynon tabletter kan öka risken för intrahepatisk kolestas.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

Microgynon tabletter rekommenderas vanligen inte under amning. Om du vill använda p-piller under amningstiden skall du rådgöra med en läkare.

Microgynon tabletter får inte användas under graviditet eller vid misstanke på graviditet. Vid misstanke på graviditet, kontakta din läkare utan dröjsmål.

Körförmåga och användning av maskiner

P-piller har inte konstaterats inverka på körförmågan.

Microgynon innehåller laktos och sackaros

Om läkaren har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta läkaren innan du tar denna medicin.

3. Hur du använder Microgynon

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Allmänt

Sannolikheten för att den preventiva effekten sviker kan öka om man glömmer att ta p-pillren eller inte tar dem enligt anvisningarna. Vid användning av Microgynon kan mängden menstruationsblod som avgår minska och blödningstiden förkortas. Menstruationssmärter kan också lindras eller försvinna helt.

I denna bipacksedel beskrivs ett flertal tillstånd då användning av p-piller bör upphöra eller då tillförlitligheten kan försämrats. Vid dessa tillstånd bör man antingen avhålla sig från samlag eller använda en icke hormonell preventivmetod såsom kondom eller ett annat, icke hormonellt skyddsmedel. Lita inte på rytmetoden eller på mätning av bastemperaturen. Dessa metoder är inte säkra eftersom p-piller påverkar de naturliga förändringarna i kroppstemperaturen och sekretet från livmoderhalsen som normalt förekommer under en menstruationscykel.

I likhet med andra p-piller skyddar Microgynon inte mot HIV-smitta (AIDS) eller mot andra sexuellt överförbara sjukdomar.

När och hur skall jag ta tablettarna?

I tablettkartan ligger 21 tabletter. Vid varje tablett är antecknad den veckodag, då tablett ska intas. Om du t.ex. tar den första tablett en tisdag, trycker du ut tablett genom aluminiumfolien vid det fack, som är märkt med ”T”. Tabletterna tas dagligen i pilarnas riktning. Med hjälp av de tomma facken kan du kontrollera, om du har tagit din dagliga tablett.

Ta tablett vid ungefär samma tidpunkt varje dag, vid behov tillsammans med vatten. Fortsätt att ta tabletterna i pilens riktning tills du tagit alla 21 tabletterna. Under de följande 7 dagarna skall du inte ta några tabletter. Menstruationen (bortfallsblödning) inträffar under dessa 7 dagar, vanligen 2-3 dagar efter den sista Microgynon tablett. Inled nästa tablettkarta på dag 8, oavsett om menstruationen fortsätter. Veckodagen då du börjar på en ny förpackning är alltså alltid densamma och bortfallsblödningen infaller vid ungefär samma tid varje månad.

När du börjar använda Microgynon tabletter

– *Du har inte använt hormonella preventivmedel under den föregående månaden*

Börja med Microgynon tabletter på menstruationscykelns första dag, dvs. den första blödningsdagen. Ta den första tablett från den ifrågasvarande veckodagens fack och fortsätt att ta tabletterna dagligen i pilens riktning. Om du gör så här Microgynon ger en säkert skydd mot graviditet från första behandlingsdagen och ett kompletterade preventivmedel (en barriärmetod) behövs inte.

Du kan även börja ta tabletterna på dag 2-5 i menstruationscykeln men i så fall bör du komplettera med ett annat preventivmedel (en barriärmetod) under den första cykelns 7 första dagar.

– *När du byter från ett annat kombinationspreparat (kombinations p-piller, p-ring eller preventiv plåster) till Microgynon*

Du kan börja ta Microgynon tabletter dagen efter att du har tagit den sista tablett av det p-pillerpreparat du tidigare använt (du skall alltså inte göra något uppehåll mellan preparaten och inte heller ta dem samtidigt). Om din nuvarande förpackning med p-piller även innehåller tabletter utan något verksamt ämne kan du börja ta Microgynon tabletter dagen efter att du har tagit den sista tablett **innehållande verksamt substans** (om du inte vet vilken tablett som avses kan du fråga din läkare eller på apoteket).

Du kan börja ta Microgynon tabletter senare men i så fall senast dagen efter att du haft ett 7 dagars uppehåll med ditt gamla preparat (eller dagen efter att du tagit den sista, gamla tablett utan innehåll av verksamt ämne).

Om du har använt p-ring eller preventiv plåster ska användandet av Microgynon påbörjas helst den dag då du avlägsnar det tidigare p-medlet eller ändå senast den dag då följande nya p-ring eller preventiv plåster borde ha lagt på plats.

Om du gör så här Microgynon ger en säkert skydd mot graviditet från första behandlingsdagen och ett kompletterade preventivmedel (en barriärmetod) behövs inte.

– *När du byter från ett preparat med enbart progestin (minipiller) till Microgynon*

Du kan upphöra med dina minipiller när som helst och börja ta Microgynon tabletter vid ordinarie tid nästa dag. Tänk på att vid samlag använda ett kompletterande preventivmedel (en barriärmetod) under de 7 första dagarna i nästa cykel.

- När du byter från antikonceptionell injektionsbehandling, kapslar eller intrauterint inlägg som innehåller progestin till Microgynon

Börja med Microgynon när du skulle ha fått nästa spruta, alternativt den dag kapseln eller intrauterint inlägg skall avlägsnas. Under samlag behövs ett kompletterande preventivmedel (en barriärmetod) under de 7 första dagarna i nästa cykel.

- Efter förlossning

Om du nyligen har fött barn kanske läkaren rekommenderar dig att invänta den första normala menstruationen innan du börjar använda Microgynon tabletter. I vissa fall kan man börja ta tabletterna även tidigare. Läkare kan ge anvisningar om detta. Om du vill använda Microgynon tabletter medan du ammar skall du rådgöra med läkare.

- Efter missfall eller abort

Rådgör med en läkare.

Om du har tagit för stor mängd av Microgynon

Inga allvarliga biverkningar har rapporterats i samband med överdosering av Microgynon tabletter. Samtidigt intag av många tabletter kan framkalla illamående, kräkningar och blödningar från slidan. Om du märker att ett barn har svält Microgynon tabletter skall du rådgöra med en läkare. Du kan också rådfråga Giftinformationcentralen, tel. (09) 471 977.

Vad skall du göra om . . .

Du glömmer att ta en tablett

- Om **mindre än 12 timmar** förflutit sedan du glömde ta tablett kvarstår preparatets preventiva effekt. Ta tablett så snart du upptäcker glömskan och ta resten av tabletterna vid ordinarie tid.
- Om **mer än 12 timmar** förflutit sedan du glömde ta tablett finns det risk för att preparatets antikonceptionella effekt försämras. Ju fler tabletter du glömmer att ta i en serie, desto större är risken för att skyddseffekten skall försämras. Risken för att du blir gravid är särskilt stor om du glömmer att ta de tabletter som ligger i början eller slutet av förpackningen. Därför skall du följa anvisningarna nedan (se även schemat senare i bipacksedel).

- Du har glömt att ta mer än en tablett ur en förpackning Rådgör med en läkare.

- Du har glömt en tablett under vecka 1

Ta den glömda tablett så snart du upptäcker glömskan (även om du blir tvungen att ta två tabletter på samma gång) och ta följande tabletter vid ordinarie tid. Använd ett kompletterande preventivmedel (en barriärmetod) under 7 dagar.

Om du hade samlag under veckan innan du glömde tablett riskerar du graviditet. Informera din läkare utan dröjsmål.

- Du har glömt en tablett under vecka 2


Ta den glömda tablett så snart du upptäcker glömskan (även om du blir tvungen att ta två tabletter på samma gång) och ta följande tabletter vid ordinarie tid. Tabletternas antikonceptionella effekt kvarstår och inget kompletterande preventivmedel behövs.

- Du har glömt en tablett under vecka 3

Du kan välja mellan följande alternativ. Inget kompletterande preventivmedel behövs.

1. Ta den glömda tablett så snart du upptäcker glömskan (även om du blir tvungen att ta två tabletter på samma gång) och ta följande tabletter vid ordinarie tid. Börja på en ny tablettkarta så snart den gamla är slut och **gör inget uppehåll mellan tabletterna**. Bortfallsblödningen kanske inte kommer innan följande förpackning är slut, men medan du äter tabletterna kan småblödningar eller genombrottsblödning förekomma.
2. Alternativt kan du sluta ta tabletterna i den karta du håller på med, göra ett uppehåll på högst 7 dagar (**räkna in även dagen med glömd tablett**) och därefter fortsätta på en ny karta. På så sätt kan du påbörja följande förpackning samma veckodag som du brukar.

Om du har glömt att ta tabletter och inte får någon menstruation under det första, ordinarie uppehållet, kan du vara gravid. Konsultera din läkare innan du börjar på nästa tablettkarta.



Vad måste du göra om du kräks eller har svår diarré

Om du får kräkningar eller svår diarré inom 3–4 timmar efter intag av en Microgynon tablett har de verksamma substanserna ännu inte helt absorberats. Situationen är densamma som om du glömmer en tablett. Följ anvisningarna för glömda tabletter.

Om du vill att menstruationen skall infalla en annan dag

Om du tar tabletterna enligt givna anvisningar kommer varje menstruationsblödning vid ungefär samma tid med 4 veckors intervaller. Om du vill ändra på detta skall du förkorta (aldrig förlänga)

uppehållet mellan följande två förpackningar. Om din menstruation exempelvis vanligen börjar på fredag och du vill att den i fortsättningen skall börja på en tisdag (3 dagar tidigare) skall du börja på nästa förpackning 3 dagar tidigare än vanligt. Om du gör ett mycket kort medicineringsuppehåll (3 dagar eller mindre) kan det hända att blödningen uteblir under de tablettfria dagarna. Medan du använder nästa förpackning kan genombråtsblödning eller småblödningar förekomma.

Om du vill uppskjuta menstruationen

Om du i undantagsfall vill uppskjuta din menstruation börja en ny tablettkarta när den gamla kartan är slut. Gör inget uppehåll mellan tablettorna. Du kan uppskjuta din menstruation genom att fortsätta att ta tablettorna utan uppehåll hur många dagar som helst, men högst tills den andra kartan är slut (3 veckor). Småblödningar eller genombrottsblödning kan förekomma under denna tid. Regelbunden användning av Microgynon tabletter påbörjas igen efter högst det vanliga uppehållet på 7 dagar.

Om du har oregelbundna blödningar

I samband med p-piller är det inte ovanligt med oregelbundna blödningar från slidan (småblödningar eller genombrottsblödning) mellan menstruationerna under de första månaderna. Du kan behöva menstruationsskydd men du skall fortsätta att ta tablettorna som vanligt. De oregelbundna blödningarna brukar upphöra när kroppen har vant sig vid p-piller (vanligen efter ca tre medicineringsomgångar). Om de oregelbundna blödningarna fortsätter, blir rikliga eller återkommer skall du informera läkare.

Om menstruationen uteblir

Om du har tagit alla tabletter på utsatt tid, inte har haft kräkningar eller tagit några andra mediciner är det mycket osannolikt att du är gravid. Fortsätt med Microgynon tabletterna som vanligt. Om menstruationen uteblir två gånger i följd kan du vara gravid. Informera omedelbart din läkare. Börja inte på nästa Microgynon förpackning förrän din läkare konstaterat att du inte är gravid.

Om du vill sluta använda Microgynon

Du kan sluta ta Microgynon tabletter när som helst. Om du inte vill bli gravid skall du konsultera läkare beträffande andra preventivmetoder.

Om du upphör med Microgynon tabletter på grund av att du vill bli gravid rekommenderas i allmänhet att du inväntar din första naturliga menstruation innan du försöker bli gravid. Detta gör det lättare att räkna ut när förlossningen skall äga rum.

När skall läkare kontaktas?

Regelbundna läkarkontroller

Den som använder p-piller skall regelbundet kontrolleras hos läkare. Vanligen görs en läkarundersökning en gång om året.

Kontakta läkare i följande fall:

- om du observerar förändringar i ditt hälsotillstånd, i synnerhet om de hänger samman med omständigheter som nämns i denna bipacksedel (se även stycke 2. *Använd inte Microgynon och Varningar och försiktighet*. Tänk även på vad som sagts om sjukdomar hos nära släktingar) om
- du känner en knuta i bröstet om du börjar använda andra mediciner (se även stycke 2. *Andra läkemedel och Microgynon*) om du blir sängliggande eller skall opereras (konsultera din läkare
- senast fyra veckor före planerad operation)
- om du får oväntade, rikliga blödningar från slidan
- om du glömde att ta tabletter under den första veckan du använde p-piller och hade samlag under de föregående sju dagarna om du har svår diarré om menstruationen uteblir två gånger i följd och
- vid misstanke på graviditet (börja inte på nästa tablettkarta innan läkare ger sin tillåtelse).
-

Upphör med tablettorna och uppsök omedelbart läkare om du noterar möjliga tecken på blodpropp, som är angivet under stycke *P-piller och blodproppar*.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Informera även din läkare om du observerar icke önskvärda biverkningar, i synnerhet om de är svåra eller envisa eller om hälsorelaterade förändringar uppträder som du tror kan hänga samman med användandet av p-pillren.

Allvarliga biverkningar

Allvarliga reaktioner med tillhörande symptom beskrivs under stycke 2 *P-piller och blodpropp / P-piller och cancer*. Läs dessa stycken noga för närmare information och konsultera vid behov din läkare utan dröjsmål.

Andra möjliga biverkningar

P-pilleranvändare har rapporterat följande biverkningar, men de är inte med säkerhet relaterade till intag av tableterna. Dessa biverkningar kan uppträda under de första månaderna och brukar lindras efter hand.

Vanliga biverkningar (förekommer hos 1–10 av 100 kvinnor): illamående, magont, viktökning, huvudvärk, depression, humörsvängningar, ömma och känsliga bröst.

Mindre vanlig biverkningar (förekommer hos 1–10 av 1000 kvinnor): kräkningar, diarré, vätskeansamling, migrän, minskad sexlust, svullna bröst, eksem, nässelfeber.

Sällsynta biverkningar (förekommer hos 1–10 av 10000 kvinnor): besvär med kontaktlinser, överkänslighetsreaktioner, viktnedgång, ökad sexlust, förändringar i vaginalt sekret, sekret från bröstet, knölros, erythema multiforme.

Om du har ärftligt angioödem (an anfallsvis uppkommande lokal svullnad i huden) kan tillförda östrogener ge upphov till eller förvärra symtomen (se till *Varningar och försiktighet*).

5. Hur Microgynon ska förvaras

Förvaras i rumstemperatur (+15+25 °C).

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- **De aktiva substanserna** är 0,15 mg levonorgestrel och 30 mikrogram etinylestradiol
- **Övriga innehållsämnen** är laktosmonohydrat 33 mg, majsstärkelse, povidon, talk, magnesiumstearat.

Dragering: Sackaros, povidon, makrogol 6000, kalciumkarbonat, talk, glycerol (85 %), montanglykolvax samt titandioxid (E 171) och gul järnoxid (E 172) som färgämnen.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

I tablettkartan ligger 21 beige, runda, konvex, sockerdragerad tabletter. Förpackning: 3 x 21 tabletter.

Innehavare av godkännande för försäljning

Bayer Oy, Pansiovägen 47, 20210 Åbo

Marknadsförare

Bayer Oy
PB 73, 02151 Esbo
Telefon 020 785 21

Tillverkare

Bayer Pharma AG, 13342 Berlin, Tyskland

Denna bipacksedel ändrades senast 23.11.2012