

**NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR**  
**Omeprazole Pfizer 10 mg gélules gastro-résistantes**  
**Omeprazole Pfizer 20 mg gélules gastro-résistantes**  
**Omeprazole Pfizer 40 mg gélules gastro-résistantes**  
oméprazole

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si leurs symptômes sont identiques aux vôtres.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez tout effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

**Dans cette notice :**

1. Qu'est-ce qu'Omeprazole Pfizer et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Omeprazole Pfizer
3. Comment prendre Omeprazole Pfizer
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Omeprazole Pfizer
6. Informations supplémentaires

**1. QU'EST-CE QU'OMEPRAZOLE PFIZER ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISÉ**

Omeprazole Pfizer contient la substance active, l'oméprazole. Omeprazole Pfizer appartient à un groupe de médicaments appelés « inhibiteurs de la pompe à protons ». Ils agissent en réduisant la quantité d'acide produite par votre estomac.

Omeprazole Pfizer est utilisé pour traiter les affections suivantes :

Chez l'adulte :

- Le « reflux gastro-œsophagien » (RGO). Dans cette affection, l'acide de l'estomac remonte dans l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac), ce qui entraîne des douleurs, une inflammation et des sensations de brûlure.
- Les ulcères touchant la partie supérieure de l'intestin (ulcère duodéal) ou l'estomac (ulcère gastrique).
- Les ulcères qui sont infectés par une bactérie appelée « *Helicobacter pylori* ». Si vous avez cette affection, votre médecin vous prescrira peut-être également des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de guérir.
- Les ulcères causés par des médicaments appelés « AINS » (anti-inflammatoires non stéroïdiens). Omeprazole Pfizer peut également être utilisé pour empêcher la formation d'un ulcère si vous prenez des AINS.
- La présence d'une trop grande quantité d'acide dans l'estomac due à une tumeur du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison).

Chez l'enfant :

*Enfants de plus d'un an et de  $\geq 10$  kg*

Le « reflux gastro-œsophagien » (RGO). Dans cette affection, l'acide de l'estomac remonte dans l'œsophage (le tube qui relie votre gorge à votre estomac), ce qui entraîne des douleurs, une inflammation et des sensations de brûlure. Chez l'enfant, les symptômes de l'affection peuvent comprendre la remontée du contenu de l'estomac dans la bouche (régurgitation), des vomissements et une faible prise de poids.

*Enfants et adolescents de plus de 4 ans*

Les ulcères qui sont infectés par une bactérie appelée « *Helicobacter pylori* ». Si votre enfant souffre de cette affection, votre médecin lui prescrira peut-être également des antibiotiques pour traiter l'infection et permettre à l'ulcère de guérir.

## 2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS À CONNAÎTRE AVANT DE PRENDRE OMEPRAZOLE PFIZER

### Ne prenez jamais Omeprazole Pfizer

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'oméprazole ou à l'un des autres composants contenus dans Omeprazole Pfizer.
- si vous êtes allergique à des médicaments contenant d'autres inhibiteurs de la pompe à protons (p. ex. pantoprazole, lansoprazole, rabéprazole, ésoméprazole).
- si vous prenez un médicament contenant du nelfinavir (utilisé dans l'infection à VIH).

En cas de doute, demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre Omeprazole Pfizer.

### Faites attention avec Omeprazole Pfizer

Omeprazole Pfizer peut masquer les symptômes d'autres maladies. Par conséquent, si vous présentez l'un des problèmes suivants avant que vous preniez Omeprazole Pfizer ou pendant que vous le preniez, prévenez immédiatement votre médecin :

- Vous perdez beaucoup de poids sans raison et avez des difficultés à avaler.
- Vous avez des douleurs d'estomac ou des problèmes d'indigestion.
- Vous commencez à vomir de la nourriture ou du sang.
- Vos selles sont noires (teintées de sang).
- Vous présentez une diarrhée sévère ou persistante, car l'oméprazole a été associé à une légère augmentation des cas de diarrhée infectieuse.
- Vous avez des problèmes hépatiques sévères.

Si vous prenez Omeprazole Pfizer sur une longue période (plus d'un an), votre médecin vous soumettra probablement à des contrôles réguliers. Vous devez signaler tout symptôme ou fait nouveau ou exceptionnel chaque fois que vous verrez votre médecin.

### Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. En effet, Omeprazole Pfizer peut influencer la façon dont certains médicaments agissent et certains médicaments peuvent influencer l'action d'Omeprazole Pfizer.

Ne prenez jamais Omeprazole Pfizer si vous prenez un médicament contenant du **nelfinavir** (utilisé dans l'infection à VIH).

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un des médicaments suivants :

- Kétoconazole, itraconazole ou voriconazole (traitement des infections causées par un champignon)
- Digoxine (traitement de problèmes cardiaques)
- Diazépam (utilisé pour traiter l'anxiété, décontracter les muscles ou en cas d'épilepsie)
- Phénytoïne (traitement de l'épilepsie). Si vous prenez de la phénytoïne, votre médecin devra vous surveiller quand vous commencerez et arrêterez de prendre Omeprazole Pfizer.
- Médicaments utilisés pour fluidifier le sang comme la warfarine ou d'autres antagonistes de la vitamine K. Votre médecin devra peut-être vous surveiller quand vous commencerez et arrêterez de prendre Omeprazole Pfizer.
- Rifampicine (traitement de la tuberculose)
- Atazanavir (traitement de l'infection à VIH)
- Tacrolimus (en cas de greffe d'organe)
- Millepertuis (*Hypericum perforatum*) (traitement de la dépression légère)
- Cilostazol (traitement de la claudication intermittente)
- Saquinavir (traitement de l'infection à VIH)
- Clopidogrel (prévention de la formation de caillots sanguins (thrombus))

Si votre médecin vous a prescrit un traitement antibiotique par amoxicilline et clarithromycine, en plus d'Omeprazole Pfizer, pour traiter des ulcères causés par une infection à *Helicobacter pylori*, il est très important que vous lui disiez si vous prenez tout autre médicament.

### **Aliments et boissons**

Les gélules peuvent être prises avec des aliments ou à jeun.

### **Grossesse et allaitement**

Avant de prendre Omeprazole Pfizer, informez votre médecin si vous êtes enceinte ou essayez de l'être. Votre médecin décidera si vous pouvez prendre Omeprazole Pfizer pendant cette période.

Votre médecin décidera si vous pouvez prendre Omeprazole Pfizer tout en allaitant.

### **Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Il est peu probable qu'Omeprazole Pfizer influence votre capacité à conduire ou à utiliser des outils ou des machines. Des effets indésirables tels qu'un étourdissement ou des troubles visuels peuvent survenir (voir rubrique 4). Si vous êtes concerné, ne conduisez pas de véhicules et n'utilisez pas de machines.

### **Informations importantes concernant certains composants d'Omeprazole Pfizer**

Omeprazole Pfizer capsules contiennent du lactose. Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

## **3. COMMENT PRENDRE OMEPRAZOLE PFIZER**

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Votre médecin vous dira combien de gélules vous devez prendre et pendant combien de temps. Cela dépendra de votre état et de votre âge.

Les doses habituelles sont indiquées ci-dessous.

#### Adultes :

Pour traiter les symptômes du RGO comme les **sensations de brûlure et les régurgitations acides** :

- Si votre médecin a établi que votre œsophage est légèrement endommagé, la dose habituelle est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines. Votre médecin vous conseillera peut-être de prendre une dose de 40 mg pendant 8 semaines supplémentaires si votre œsophage n'a pas encore guéri.
- Après la guérison de l'œsophage, la dose habituelle est de 10 mg une fois par jour.
- Si votre œsophage n'a pas été endommagé, la dose habituelle est de 10 mg une fois par jour.

Pour traiter les **ulcères de la partie supérieure de l'intestin** (ulcères duodénaux) :

- La dose habituelle est de 20 mg une fois par jour pendant 2 semaines. Votre médecin vous conseillera peut-être de prendre la même dose pendant 2 semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas encore guéri.
- Si l'ulcère ne guérit pas complètement, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 4 semaines.

Pour traiter les **ulcères de l'estomac** (ulcères gastriques) :

- La dose habituelle est de 20 mg une fois par jour pendant 4 semaines. Votre médecin vous conseillera peut-être de prendre la même dose pendant 4 semaines supplémentaires si votre ulcère n'a pas encore guéri.
- Si l'ulcère ne guérit pas complètement, la dose peut être augmentée à 40 mg une fois par jour pendant 8 semaines.

Pour **prévenir de nouveaux ulcères duodénaux et gastriques** :

- La dose habituelle est de 10 ou 20 mg une fois par jour. Il se peut que votre médecin l'augmente à 40 mg une fois par jour.

Pour traiter les **ulcères duodénaux et gastriques causés par les AINS** (anti-inflammatoires non stéroïdiens):

- La dose habituelle est de 20 mg une fois par jour pendant 4 à 8 semaines.

Pour **prévenir les ulcères duodénaux et gastriques** si vous prenez des **AINS** :

- La dose habituelle est de 20 mg une fois par jour.

Pour traiter et prévenir les **ulcères causés par une infection à *Helicobacter pylori*** :

- La dose habituelle est de 20 mg d'Omeprazole Pfizer deux fois par jour pendant une semaine.
- Votre médecin vous dira aussi de prendre deux antibiotiques parmi l'amoxicilline, la clarithromycine et le métronidazole.

Pour traiter la présence d'une trop grande quantité d'acide dans l'estomac causée par une **tumeur du pancréas (syndrome de Zollinger-Ellison)** :

- La dose habituelle est de 60 mg par jour.
- Votre médecin adaptera la dose en fonction de vos besoins et décidera combien de temps vous devez prendre ce médicament.

#### Enfants :

Traitement des symptômes du RGO comme les **sensations de brûlure et les régurgitations acides** :

- Les enfants de plus d'un an et dont le poids corporel est supérieur à 10 kg peuvent prendre Omeprazole Pfizer. La dose à utiliser chez l'enfant dépend de son poids et le médecin déterminera la dose adéquate.

Pour traiter les **ulcères causés par une infection à *Helicobacter pylori*** et les empêcher de revenir :

- Les enfants de plus de 4 ans peuvent prendre Omeprazole Pfizer. La dose à utiliser chez l'enfant dépend de son poids et le médecin déterminera la dose adéquate.
- Votre médecin prescrira également deux antibiotiques appelés amoxicilline et clarithromycine à votre enfant.

#### **Comment prendre ce médicament**

- Il est recommandé de prendre vos gélules le matin.
- Les gélules peuvent être prises avec des aliments ou à jeun.
- Avalez les gélules telles quelles, avec un demi-verre d'eau. Ne pas croquer ni mâcher les gélules. En effet, les gélules contiennent des granules enrobés, qui empêchent le médicament d'être dégradé par l'acide de l'estomac. Il est important de ne pas endommager ces granules.

#### **Que faire si vous ou votre enfant éprouvez des difficultés à avaler les gélules**

- Si vous ou votre enfant éprouvez des difficultés à avaler les gélules :
  - Ouvrez la gélule et avalez directement son contenu avec un demi-verre d'eau ou versez son contenu dans un verre d'eau plate (non pétillante), de jus de fruits acide (p. ex. pomme, orange ou ananas) ou de compote de pomme.
  - Mélangez toujours la préparation juste avant de la boire (la préparation ne sera pas homogène). Buvez ensuite la préparation immédiatement ou dans les 30 minutes qui suivent.
  - Pour être sûr que vous avez avalé tout le médicament, rincez bien le verre avec un demi-verre d'eau et buvez-le. Les éléments solides contiennent le médicament – ne pas les croquer ni mâcher.

#### **Si vous avez pris plus d'Omeprazole Pfizer que vous n'auriez dû**

Si vous avez utilisé ou pris trop d'Omeprazole Pfizer que votre médecin vous a prescrit, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien, ou le centre Antipoison (070/245.245).

#### **Si vous oubliez de prendre Omeprazole Pfizer**

Si vous oubliez de prendre une dose, prenez-la dès que vous y pensez. Toutefois, s'il est presque l'heure de prendre la dose suivante, sautez celle que vous avez oubliée. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

#### 4. QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES ÉVENTUELS

Comme tous les médicaments, Omeprazole Pfizer peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Si vous remarquez l'un des effets indésirables rares mais graves suivants, arrêtez de prendre Omeprazole Pfizer et contactez immédiatement un médecin :**

- Respiration sifflante soudaine, gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge ou de l'ensemble du corps, éruption cutanée, évanouissement ou difficultés à avaler (réactions allergiques graves).
- Rougeur de la peau s'accompagnant de vésicules ou d'un décollement de la peau. Des vésicules sévères et des saignements peuvent également apparaître au niveau des lèvres, des yeux, de la bouche, du nez et des organes génitaux. Il pourrait s'agir du « syndrome de Stevens-Johnson » ou du « syndrome de Lyell ».
- Peau jaune, urines foncées et fatigue, qui peuvent être des symptômes de problèmes hépatiques.

Les effets indésirables peuvent survenir suivant certaines fréquences, définies ci-dessous :

Très fréquent :	touche plus de 1 utilisateur sur 10
Fréquent :	touche entre 1 et 10 utilisateurs sur 100
Peu fréquent :	touche entre 1 et 10 utilisateurs sur 1 000
Rare :	touche entre 1 et 10 utilisateurs sur 10 000
Très rare :	touche moins de 1 utilisateur sur 10 000
Fréquence indéterminée :	la fréquence ne peut être estimée sur la base des données disponibles

Les autres effets indésirables sont :

##### **Effets indésirables fréquents**

- Mal de tête.
- Effets sur votre estomac ou intestin : diarrhée, douleur à l'estomac, constipation, gaz (flatulences).
- Nausées ou vomissements.

##### **Effets indésirables peu fréquents**

- Gonflement des pieds et des chevilles.
- Troubles du sommeil (insomnie).
- Étourdissement, picotements et fourmillements, envie de dormir.
- Tête qui tourne (vertige).
- Modifications des analyses sanguines qui contrôlent le fonctionnement du foie.
- Éruption cutanée, éruption papuleuse (urticaire) et démangeaisons.
- Sensation de malaise général et manque d'énergie.

##### **Effets indésirables rares**

- Problèmes sanguins, p. ex. réduction du nombre de globules blancs ou de plaquettes. Ils peuvent provoquer une faiblesse, des bleus (ecchymoses) ou favoriser les infections.
- Réactions allergiques, parfois très graves, y compris un gonflement des lèvres, de la langue et de la gorge, une fièvre, une respiration sifflante.
- Faible taux de sodium dans le sang, qui peut provoquer une faiblesse, des vomissements et des crampes.
- Agitation, confusion ou humeur dépressive.
- Altération du goût.
- Problèmes oculaires tels que vision trouble.
- Respiration sifflante soudaine ou essoufflement (bronchospasme).
- Bouche sèche.

- Inflammation de l'intérieur de la bouche.
- Infection appelée « muguet », qui peut affecter l'intestin et est causée par un champignon.
- Problèmes hépatiques, y compris la jaunisse, qui peut donner une peau jaune, des urines foncées et une fatigue.
- Chute de cheveux (alopécie).
- Éruption cutanée en cas d'exposition au soleil.
- Douleurs articulaires (arthralgie) ou musculaires (myalgie).
- Problèmes rénaux graves (néphrite interstitielle).
- Augmentation de la transpiration

#### **Effets indésirables très rares**

- Modifications du nombre de cellules sanguines, dont agranulocytose (absence de globules blancs).
- Agressivité.
- Perception par la vue, le toucher ou l'ouïe de choses qui n'existent pas (hallucinations).
- Problèmes hépatiques graves entraînant une insuffisance hépatique et une inflammation du cerveau.
- Apparition soudaine d'une éruption cutanée sévère, de vésicules ou d'un décollement de la peau. Ces symptômes peuvent être associés à une forte fièvre et à des douleurs articulaires (érythème polymorphe, syndrome de Stevens-Johnson, syndrome de Lyell).
- Faiblesse musculaire.
- Augmentation du volume des seins chez l'homme.
- Faible taux de magnésium dans le sang.

Dans de très rares cas, Omeprazole Pfizer peut affecter les globules blancs et entraîner un déficit immunitaire. Si vous présentez une infection caractérisée par des symptômes tels qu'une fièvre s'accompagnant d'une dégradation **sévère** de votre état général, ou une fièvre accompagnée de symptômes d'une infection locale tels qu'une douleur au niveau du cou, de la gorge ou de la bouche, ou des difficultés à uriner, consultez votre médecin au plus vite afin de pouvoir exclure une absence de globules blancs (agranulocytose) à l'aide d'une analyse sanguine. Il est alors important que vous signaliez que vous prenez ce médicament.

Ne vous inquiétez pas de cette liste d'effets indésirables éventuels. Vous n'en présenterez peut-être aucun. Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER OMEPRAZOLE PFIZER**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Omeprazole Pfizer après la date de péremption mentionnée sur la plaquette thermoformée, la boîte et l'étiquette du flacon après EXP. La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

A conserver à une température ne dépassant pas 30°C.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

## **6. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES**

### **Que contient Omeprazole Pfizer**

La substance active est l'oméprazole. Chaque gélule gastro-résistante contient 10 mg ou 20 mg ou 40 mg d'oméprazole.

Les autres composants sont :

*Contenu des gélules* : lactose monohydraté, laurylsulphate de sodium, cellulose microcristalline (E460), hydroxypropylcellulose (E463), mannitol (E421), hydrogenophosphate disodique dihydraté (E339), hypromellose (E464), triéthylcitrate (E1505), talc (E553b), acide méthacrylique: copolymère d'acrylate d'éthyle (1:1) monostéarate de glycérol 40-55, polysorbate 80 (E433), dioxyde de titane (E171)

*Gélules* : oxyde de fer rouge (E172), dioxyde de titane (E171), gélatine, laurylsulphate de sodium  
*Encre d'impression* : shellac (E904), propylène glycol (E1520), oxyde de fer noir (E172), hydroxyde de potassium (E525)

### Qu'est-ce que Omeprazole Pfizer et contenu de l'emballage extérieur

Gélule gastro-résistante.

Omeprazole Pfizer 10 mg :

Gélules en gélatine rose/rose, taille '3', imprimées en encre noire de 'E' sur la tête rose et de '65' sur le corps rose, remplies de granulés blancs à blanc cassé, couvertes d'un pelliculage gastro-résistant.

Omeprazole Pfizer 20 mg :

Gélules en gélatine brun rougeâtre/rose, taille '1', imprimées en encre noire de 'E' sur la tête brun rougeâtre et de '67' sur le corps rose, remplies de granulés blancs à blanc cassé, couvertes d'un pelliculage gastro-résistant.

Omeprazole Pfizer 40 mg :

Gélules en gélatine brun rougeâtre/brun rougeâtre, taille '0', imprimées en encre noire de 'E' sur la tête brun rougeâtre et de '69' sur le corps brun rougeâtre, remplies de granulés blancs à blanc cassé, couvertes d'un pelliculage gastro-résistant.

Omeprazole Pfizer gélules sont disponibles en plaquettes thermoformées  
 PVC/Polyamide/Aluminium/PVC/Papier/Polyester/Aluminium et en flacons HDPE.

Plaquettes thermoformées PVC/Polyamide/Aluminium/PVC/Papier/Polyester/Aluminium:

*Omeprazole Pfizer 10 mg*: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 et 500 gélules

*Omeprazole Pfizer 20 mg*: 1, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 98, 100, 250, 500 et 1000 gélules

*Omeprazole Pfizer 40 mg*: 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 et 500 gélules

Flacon HDPE avec un désiccant gel silice dans un opercule en polypropylène:

*Omeprazole Pfizer 10 mg, 20 mg & 40 mg*: 14, 28, 50 et 500 gélules

Toutes les présentations peuvent ne pas être commercialisées.

### Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricants

*Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché*

Pfizer SA, Boulevard de la Plaine, 1050 Bruxelles

### Fabricants

~~Pfizer Service Company BVBA, Hoge Wei 10, 1930, Zaventem, Belgique~~

Pfizer PGM, Zone industrielle, 29, route des Industries, 37530 Pocé-sur-Cisse, France

~~Pfizer Italia s.r.l, Localita Marino del Tronto, 63100 Ascoli Piceno, Italie~~

### Numéros de l'autorisation de mise sur le marché

10 mg (plaquette thermoformée): BE399366

10 mg (flacon): BE399375

20 mg (plaquette thermoformée): BE399384

20 mg (flacon): BE399393

40 mg (plaquette thermoformée): BE399402

40 mg (flacon): BE399411

### Mode de délivrance

Médicament soumis à prescription médicale.

**Ce médicament est autorisé dans les États membres de l'Espace Economique Européen sous les noms suivants :**

Autriche	Omeprazol Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg magensaftresistente kapseln
Belgique	Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg Gélules gastro-résistantes

Allemagne	Omeprazol Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg magensaftresistente kapseln
Danemark	Omeprazol "Pfizer" 10 mg/20 mg/ 40 mg enterokapsler
Estonie	Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg
Grèce	Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg γαστροανθεκτικό καψάκιο, σκληρό
Espagne	Omeprazol Pharmacia 10 mg/ 20 mg/ 40 mg Capsulas duras gastro-resistentes
Finlande	Omeprazol Pfizer
Hongrie	Omeprazol Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg gyomornedv-ellenálló kapszulla
Irlande	Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg /40 mg gastro-resistant capsules
Italie	Omeprazolo Pfizer
Lituanie	Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg skrandyje neiri kapsule
Luxembourg	Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg Gélules gastro-resistentes
Lettonie	Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg zarnās skīstosas kapsulas
Malte	Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg Gastro-resistant capsules
Pays-Bas	Omeprazol Pfizer 10 mg/ 20 mg/ 40 mg maagsapresistente capsules
Norvège	Omeprazol Pfizer
Portugal	Omeprazol Parke-Davis
Roumanie	Omeprazol Pfizer 10 mg/ 20mg/ 40mg capsule gastrorezistente
Suède	Omeprazol Pfizer
Royaume-Uni	Omeprazole Pfizer 10 mg/ 20 mg / 40 mg gastro-resistant capsules

**La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est 09/2011**

**11F06**