

Folheto informativo: Informação para o utilizador

Salofalk 500 mg Supositórios

Messalazina

Leia com atenção todo este folheto antes de começar a utilizar este medicamento pois contém informação importante para si.

- Conserve este folheto. Pode ter necessidade de o ler novamente.
- Caso ainda tenha dúvidas, fale com o seu médico ou farmacêutico.
- Este medicamento foi receitado apenas para si. Não deve dá-lo a outros. O medicamento pode ser-lhes prejudicial mesmo que apresentem os mesmos sinais de doença.
- Se tiver quaisquer efeitos secundários, incluindo possíveis efeitos secundários não indicados neste folheto, fale com o seu médico ou farmacêutico. Ver secção 4.

O que contém este folheto:

1. O que é Salofalk 500 mg Supositórios e para que é utilizado
2. O que precisa de saber antes de utilizar Salofalk 500 mg Supositórios
3. Como utilizar Salofalk 500 mg Supositórios
4. Efeitos secundários possíveis
5. Como conservar Salofalk 500 mg Supositórios
6. Conteúdo da embalagem e outras informações

1. O que é Salofalk 500 mg Supositórios e para que é utilizado

Messalazina, a substância ativa de Salofalk 500 mg Supositórios, é uma substância anti-inflamatória utilizada no tratamento de doenças inflamatórias do intestino.

Salofalk 500 mg supositórios está indicado no tratamento de:

- Colite ulcerosa (no tratamento de episódios agudos e na prevenção de recorrências).
- Doença de Crohn (no tratamento de episódios agudos).
- Processos inflamatórios da região ano-retal.

2. O que precisa de saber antes de utilizar Salofalk 500 mg Supositórios

Não utilize Salofalk 500 mg supositórios

- se é, ou lhe foi dito que é, hipersensível (alérgico) ou ácido salicílico, aos salicilatos como a Aspirina, ou a qualquer dos outros componentes de Salofalk 500 mg supositórios (indicados na secção 6. Conteúdo da embalagem e outras informações);
- se tem uma doença hepática ou renal grave.

Advertências e precauções

Fale com o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar Salofalk 500 mg

Supositórios

- se tem antecedentes de problemas pulmonares, em particular asma brônquica.
- se tem antecedentes de alergia à sulfassalazina, uma substância aparentada com a messalazina.
- se sofre de problemas hepáticos (do fígado)
- se sofre de problemas renais (dos rins).

Durante o tratamento o seu médico poderá supervisioná-lo mais frequentemente e poderá solicitar-lhe regularmente análises de sangue e urina.

Outros medicamentos e Salofalk 500 mg Supositórios

Antes de iniciar o tratamento com Salofalk 500 mg Supositórios deve informar o seu médico se está a tomar ou utilizar algum dos medicamentos descritos de seguida pois o efeito destes medicamentos pode alterar-se (interações):

- Azatioprina, 6-mercaptopurina ou tioguanina (medicamentos usados para tratar problemas imunológicos)
- Algumas substâncias que inibem a coagulação sanguínea (medicamentos para a trombose ou para fluidificar o sangue como por ex. a varfarina).

Informe o seu médico ou farmacêutico se estiver a tomar, tiver tomado recentemente ou se vier a tomar outros medicamentos. Pode continuar a ser adequado que faça o tratamento com Salofalk 500 mg supositórios mas será o seu médico a decidir o mais indicado para si.

Gravidez e amamentação

Se está grávida ou a amamentar, se pensa estar grávida ou planeia engravidar, consulte o seu médico ou farmacêutico antes de utilizar este medicamento.

Durante a gravidez apenas deverá utilizar Salofalk 500 mg Supositórios se o seu médico assim o prescrever.

De igual modo, apenas deverá utilizar Salofalk 500 mg Supositórios durante a amamentação se o seu médico assim o prescrever, uma vez que a substância ativa e o seu metabolito podem passar para o leite materno.

Condução de veículos e utilização de máquinas

Não foram observados efeitos sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas.

Salofalk 500 mg supositórios contém álcool cetílico. O álcool cetílico que pode causar uma erupção localizada (por exemplo dermatite de contacto).

3. Como utilizar Salofalk 500 mg Supositórios

Utilize este medicamento exatamente como indicado pelo seu médico. Fale com o seu médico ou farmacêutico se tiver dúvidas.