

DIES IST EIN ARZNEIMITTEL AUF PFLANZENBASIS.

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen. Sie enthält wichtige Informationen für Ihre Behandlung.

Wenn Sie weitere Fragen haben, oder bei Zweifel, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Apotheker.
- Bei Verschlimmerung oder Anhalten der Symptome, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist KAMILLOSAN 2 % Creme und wofür wird es angewendet ?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von KAMILLOSAN 2 % Creme beachten ?
3. Wie ist KAMILLOSAN 2 % Creme anzuwenden ?
4. Mögliche Nebenwirkungen.
5. Wie ist KAMILLOSAN 2 % Creme aufzubewahren ?
6. Weitere Angaben.

KAMILLOSAN 2 % Creme

(Aethanolic (95,4 % V/V) extract. chamomillae flos. (2,75 :1))

Der Wirkstoff ist ein ethanolischer Extrakt (95,4 % V/V) aus Kamillenblüten (Chamomilla Recutita (L.) Rauschert) (2,75:1) 2 g mit: ätherischem Öl mind. 20 mg davon Levomenol (∞ bisabolol) mind. 7 mg.

Die sonstigen Bestandteile sind : Amphocerin E – Cutina LE – Isopropylmyristat – Methyl 4-hydroxybenzoat – Propyl 4-hydroxybenzoat – Glycerol 85 % - Wasser – pro 100 g.

Registrierungsinhaber:

Meda Pharma – Chaussée de la Hulpe/Terhulpesteenweg 166 – 1170 Bruxelles/Brussel

Hersteller : Meda Pharma GmbH & Co. KG – Bad Homburg (D)

Registrierungsnummer : 152 IS 358 F 7

1. Was ist KAMILLOSAN 2 % Creme und wofür wird es angewendet ?

Pharmazeutische Form und Verpackung : Hautcreme – Tube mit 40 g Creme.

Pharmakotherapeutische Gruppe und Wirkungsweise : lindernde Creme, die auch zur Behandlung von Hautentzündungen angewandt wird.

Angezeigt bei : dieses Medikament auf Pflanzenbasis wird lokal verwendet als ergänzende Behandlung von Hautleiden als Linderungsmittel, gegen Jucken, wundheilend, gegen Entzündungen und bei Kapillarfragilität, nachdem jede andere ernste Erkrankung ausgeschlossen wurde.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von KAMILLOSAN 2 % Creme beachten ?

KAMILLOSAN 2 % Creme darf nicht angewendet werden bei Überempfindlichkeit gegen den Wirkstoff oder einen der sonstigen Bestandteile.

Wenn Sie andere Medikamente anwenden, lesen Sie bitte den Paragraphen "Anwendung von KAMILLOSAN 2 % Creme zusammen mit anderen Medikamenten".

Konsultieren Sie bitte Ihren Arzt falls eine der oben erwähnten Warnungen für Sie anwendbar ist oder ob sie es war in der Vergangenheit.

Anwendung von KAMILLOSAN 2 % Creme zusammen mit Speisen und Getränken : entfällt

Schwangerschaft

Fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker um Rat vor der Anwendung jedes Arzneimittels.

Stillzeit

Fragen Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker um Rat vor der Anwendung jedes Arzneimittels.

Während der Stillzeit darf KAMILLOSAN 2 % Creme nicht auf die Brüste aufgetragen werden.

Verkehrstüchtigkeit und Bedienen von Maschinen : entfällt

Wichtige Informationen bezüglich eines der Bestandteile von KAMILLOSAN 2 % Creme

KAMILLOSAN 2 % Creme enthält Methyl-4-Hydroxybenzoat und Propyl-4-Hydroxybenzoat und deswegen kann Kontaktekzem möglicherweise auftreten. Selten wurden Reaktionen wie Urtikaria oder Bronchienkrampf beobachtet.

Anwendung von KAMILLOSAN 2 % Creme zusammen mit anderen Medikamenten

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel einnehmen bzw. vor kurzem eingenommen haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

3. Wie ist KAMILLOSAN 2 % Creme anzuwenden ?

Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, soweit Ihr Arzt oder Apotheker nicht anders verordnet hat.

2 oder 3 mal täglich dünn auf die Haut auftragen und leicht einmassieren.

Kontakt mit den Augen vermeiden. Bei Eindringen ins Auge, mit Wasser spülen.

Keine längere Anwendung ohne ärztliche Anweisung.

Wenn Sie die Einnahme von KAMILLOSAN 2 % Creme vergessen haben : entfällt

Auswirkungen, wenn die Behandlung mit KAMILLOSAN 2 % Creme abgebrochen wird:

Die Behandlung nicht frühzeitig abbrechen. Verständigen Sie Ihren Arzt oder Apotheker falls Sie die Behandlung abbrechen wollen.

Wenn Sie eine grössere Menge von KAMILLOSAN 2 % Creme angewendet haben, als Sie sollten:

Bei versehentlicher Einnahme von einer grossen Menge KAMILLOSAN 2 % Creme, so schnell möglich den Arzt, den Apotheker oder das Antgiftzentrum (070/245 245) verständigen.

Die Behandlung wird in den meisten Fällen symptomatisch sein.

4. Mögliche Nebenwirkungen

Wie alle Arzneimittel kann KAMILLOSAN 2 % Creme Nebenwirkungen haben.

In Ausnahmefällen wurden Überempfindlichkeitsreaktionen auf Kamille (z.B. Kontaktekzem)

beobachtet. Einzige Fälle von anaphylaktischen Schock sowie von Asthma wurden gemeldet.

Kreuzreaktionen können auftreten bei Allergie gegen Korbblütler (z.B. Beifuss (*Artemisia vulgaris* L.)).

In diesem Fall, die Creme nicht mehr auftragen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, und die Sie als ernsthaft betrachten, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

5. Wie ist KAMILLOSAN 2 % Creme aufzubewahren ?

Ausser Reichweite und Sicht von Kindern aufbewahren.

Bei Zimmertemperatur (15-25°C) und in der Originalpackung aufbewahren.

Haltbarkeit : Sie dürfen KAMILLOSAN 2 % Creme nach dem auf dem Etikett bei "EX" angegebenen Verfalldatum nicht mehr verwenden.

6. Weitere Angaben

Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Registrierungsinhaber :

VIATRIS – Chaussée de la Hulpe/Terhulpesteenweg 166 – 1170 Bruxelles/Brüssel –

Tel. 02 / 504 08 11

KAMILLOSAN 2 % Creme ist ein Produkt zubereitet auf Basis von natürlichen Bestandteilen (Kamilleblüten). Deshalb kann der Geruch und die Farbe leicht variieren bei verschiedenen Chargen.

Ablieferung : rezeptfreie Abgabe.

Letzter Stand der Information : Februar 2006