

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice puisqu'elle contient des informations importantes.**

Ce médicament est disponible sans prescription.

Néanmoins vous devez utiliser méticuleusement Aknemycin 2% solution pour application cutanée afin d'atteindre les meilleurs résultats.

- Garder cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre pharmacien.
- Consultez votre médecin si les symptômes s'aggravent ou persistent.

Contenu de cette notice

1. *Qu'est-ce que Aknemycin 2% solution pour application cutanée et dans quel cas est-il utilisé?*
2. *Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Aknemycin 2% solution pour application cutanée ?*
3. *Comment utiliser Aknemycin 2% solution pour application cutanée?*
4. *Les effets indésirables éventuels.*
5. *Comment conserver Aknemycin 2% solution pour application cutanée?*
6. *Informations supplémentaires.*

**Aknemycin 2% solution pour application cutanée**

Aknemycin 2% solution pour application cutanée contient comme principe actif 0,02g d'érythromycine par gramme.

Les autres composants sont : éthanol, glycérol, phosphate de laurylpolyglycol et polyvidone.

Titulaire de l'Autorisation de Mise sur le Marché –et Fabricant: Almirall Hermal GmbH – D-21465 Reinbek – Allemagne

Si vous le désirez, vous pouvez aussi prendre contact avec :

Almirall S.A.  
Medialaan 32 B 4  
1800 Vilvoorde  
02/771 86 37

Numéro de l'Autorisation de Mise sur le Marché: 3600 IE 1 F 7

**1. Qu'est-ce que Aknemycin 2% solution pour application cutanée et dans quel cas est-il utilisé?**

- Aknemycin 2% solution pour application cutanée est conditionné dans un flacon applicateur en verre transparent ou brun ou opaque de 25 ml avec un bouchon à vis.
- Aknemycin 2% solution est également disponible sous forme d'onguent.
- La solution contient de l'érythromycine, un antibiotique (de type macrolide) à usage local externe dans l'acné.

- Utilisez Aknemycin 2% solution dans l'acné inflammatoire présentant des papules et des pustules.

## **2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Aknemycin 2% solution pour application cutanée?**

### **N'utilisez pas Aknemycin 2% solution:**

- Si vous êtes hypersensible (allergique) à l'érythromycine, à d'autres antibiotiques similaires (de type macrolide) ou à l'un des autres composants de l'Aknemycin 2 % solution.

### **Faites attention avec Aknemycin 2% solution :**

- Lorsque l'Aknemycin 2 % solution entre en contact avec les yeux, les muqueuses et une peau lésée, il faut rincer abondamment avec de l'eau.
- Si vous êtes hypersensible à d'autres antibiotiques de type macrolide. Une hypersensibilité croisée est possible.
- Une résistance croisée avec d'autres macrolides et avec la lincomycine et la clindamycine peut se produire.
- S'il n'y a pas d'amélioration, il faut tenir compte d'une résistance bactérienne.
- Si vous prenez d'autres médicaments, veuillez lire la rubrique "Utilisation d'Aknemycin 2% solution en association avec d'autres médicaments".

### **Utilisation d'Aknemycin 2% solution en association avec des aliments ou des boissons**

Non applicable.

### **Grossesse**

En ce qui concerne l'utilisation pendant la grossesse, aucun effet nuisible n'a été rapporté jusqu'à présent.

Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser tout médicament.

### **Allaitement**

En ce qui concerne l'utilisation pendant l'allaitement, aucun effet nuisible n'a été rapporté jusqu'à présent.

Veuillez demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant d'utiliser tout médicament.

### **Conduite d'un véhicule et utilisation de machines.**

Aknemycin 2% solution n'a pas d'influence sur la capacité de conduire un véhicule et d'utiliser des machines.

### **Informations importantes concernant certains composants d'Aknemycin 2% solution**

Ne pas mélanger l'Aknemycin 2% solution avec des oxydants ni avec de l'eau puisqu'ils rendent l'érythromycine inactive.

### **Utilisation d'Aknemycin 2% solution en association avec d'autres médicaments**

Veillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous utilisez d'autres médicaments ou si vous en avez utilisé récemment même s'il s'agit de médicaments obtenus sans ordonnance.

Une application simultanée d'autres médicaments à usage local dans l'acné, en particulier les produits favorisant l'exfoliation (e.a. le peroxyde de benzoyle, la trétinoïne), peut aggraver l'irritation de la peau.

### **3. Comment utiliser Aknemycin 2% solution pour application cutanée?**

*Veillez suivre rigoureusement ces instructions, à moins que votre médecin vous en ait donné d'autres. En cas d'incertitude, veuillez consulter votre médecin ou votre pharmacien.*

A l'aide de l'applicateur, la solution sera directement appliquée sur la peau à raison de deux fois par jour.

Aknemycin 2 % solution ne peut pas entrer en contact avec les yeux.

#### **Si vous avez oublié d'utiliser Aknemycin 2% solution:**

Non applicable.

#### **Effets pouvant apparaître lorsque le traitement par Aknemycin 2% solution est arrêté:**

Non applicable.

#### **Si vous avez utilisé plus de Aknemycin 2% solution que vous n'auriez dû:**

Si vous avez utilisé trop d'Aknemycin 2% solution, prenez immédiatement contact avec votre médecin, votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245 245).

La dose d'érythromycine appliquée est trop faible pour entraîner une toxicité systémique. 1 flacon d'Aknemycin 2% solution contient 23,125 g d'alcool.

### **4. Effets indésirables éventuels**

*Comme tous les médicaments, Aknemycin 2% solution peut avoir des effets indésirables.*

Une peau sèche, des rougeurs, une sensation d'irritation et des démangeaisons peuvent se manifester. Dans ce cas, il est préférable de continuer le traitement en appliquant Aknemycin 2% onguent, qui est un produit moins desséchant. Aknemycin 2% solution peut également être appliquée en alternance avec l'onguent.

Si les rougeurs ou les démangeaisons s'aggravent, vous devez consulter votre médecin.

Si vous constatez un effet non désirable non mentionné dans cette notice et que vous considérez comme grave, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

### **5. Comment conserver Aknemycin 2% solution pour application cutanée ?**

- Tenir Aknemycin hors de portée et de la vue des enfants !
- Conserver dans l'emballage d'origine et à une température ne dépassant pas 25°C.

**Date de péremption:** N'utilisez plus Aknemycin après la date de péremption figurant sur

l'emballage après la mention "EXP" sur le flacon et l'emballage extérieur. Cette date est toujours le dernier jour du mois indiqué.

## **6. Informations supplémentaires**

*Prenez contact avec votre médecin ou votre pharmacien pour toute information relative à ce médicament.*

Délivrance libre.

A. La dernière mise à jour de cette notice date du décembre 2007

B. La date de l'approbation de la notice est le 16/01/2008