

GEBRAUCHSINFORMATION: INFORMATION FÜR DEN ANWENDER

DIFFERIN® 0,1% Creme DIFFERIN® 0,1% Gel Adapalen

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie mit der Anwendung dieses Arzneimittels beginnen.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker.
- Dieses Arzneimittel wurde Ihnen persönlich verschrieben. Geben Sie es nicht an Dritte weiter. Es kann anderen Menschen schaden, auch wenn diese die gleichen Beschwerden haben wie Sie.
- Wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind, informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Differin und wofür wird es angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Differin beachten?
3. Wie ist Differin anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Differin aufzubewahren?
6. Weitere Informationen

1. WAS IST DIFFERIN UND WOFÜR WIRD ES ANGEWENDET?

Differin ist ein lokales Produkt gegen Akne und gehört zur Familie der Retinoide. Es wirkt gegen die abnormale Akkumulation von Hornzellen in den Poren der Haut. Dadurch verringert sich die Anzahl der Mitesser (schwarze Pünktchen), Pickel und Pusteln. Es wirkt auch auf die Entzündungsverletzungen bei Akne ein.

Differin ist angezeigt zur lokalen Behandlung von Akne vulgaris in den Bereichen Gesicht, Brust und Rücken, wo vor allem Mitesser, Pickel und Pusteln vorkommen.

2. WAS MÜSSEN SIE VOR DER ANWENDUNG VON DIFFERIN BEACHTEN?

Differin darf nicht angewendet werden,

– wenn Sie überempfindlich (allergisch) gegen Adapalen oder einen der sonstigen Bestandteile von Differin sind.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Differin ist erforderlich,

- wenn eine Reaktion auftritt, die auf Überempfindlichkeit oder starke Irritation hinweist. In diesem Fall muss die Anwendung des Medikaments abgebrochen werden. Wenn die Irritation nicht zu stark ist, wird empfohlen, das Produkt weniger häufig anzuwenden oder seinen Gebrauch zeitweise zu unterbrechen.
- Differin darf nicht mit Augen, Mund, Nasenlöchern oder Schleimhäuten in Berührung kommen. Hat eine Berührung stattgefunden, sofort mit lauwarmem Wasser ausspülen.
Differin darf nicht auf beschädigte Haut (Schnitt- oder Kratzwunden) oder ekzematöse Haut aufgetragen werden.
- Wiederholte Einwirkung von Sonnenlicht und UV-Strahlen vermeiden.

Bei Anwendung von Differin mit anderen Arzneimitteln

- Es sind keine Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten zur äußeren Anwendung bekannt. Die gleichzeitige Anwendung von Produkten der gleichen Gruppe (Retinoide, Vitamin-A-Derivate) sollte jedoch vermieden werden.
- Vermeiden Sie den gleichzeitigen Gebrauch von Differin und Produkten mit einer abschuppenden, stark reinigenden oder austrocknenden Wirkung, da sonst ein zusätzlicher, irritierender Effekt verursacht werden kann.
- Andere Mittel gegen Akne wie Produkte auf der Basis von Erythromycin oder Clindamycin oder wässrige Gele auf der Basis von Benzoylperoxid können jedoch morgens angewandt werden, wenn Differin abends aufgebracht wird.
- Wechselwirkungen mit oral eingenommenen Medikamenten sind unwahrscheinlich.
- Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker; wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Schwangerschaft und Stillzeit

Differin darf in der Schwangerschaft nicht angewendet werden.

Wenn Sie während der Anwendung von Differin schwanger werden, müssen Sie die Behandlung beenden. Informieren Sie so bald wie möglich Ihren Arzt, damit er Sie weiter beobachten kann.

Differin kann in der Stillzeit angewendet werden. Um eine Exposition des Säuglings durch direkten Kontakt zu vermeiden, ist eine Applikation von Differin auf die Brust in der Stillzeit zu vermeiden.

Fragen Sie vor der Einnahme von allen Arzneimitteln Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Differin

Differin Gel enthält Methyl-p-hydroxybenzoat (E218), das allergische Reaktionen verursachen kann, und Propylenglycol (E1520), das Hautreizungen verursachen kann. Differin Creme enthält Methyl-p-hydroxybenzoat (E218) und Propyl-p-hydroxybenzoat (E216), die allergische Reaktionen verursachen können.

3. WIE IST DIFFERIN ANZUWENDEN?

Wenden Sie Differin immer genau nach Anweisung des Arztes an. Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Differin darf nur bei Erwachsenen und Kindern ab 12 Jahren angewendet werden. Tragen Sie einmal täglich vor dem Zubettgehen und nach dem Waschen einen dünnen Film Differin auf die betroffenen Stellen auf, die vollkommen trocken sein müssen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Augen und Lippen. Je nach Empfindlichkeit Ihrer Haut benutzen Sie die Creme oder das Gel. Falls Sie eine trockene, zarte Haut haben, raten wir Ihnen die Creme an. Bitte befolgen Sie die Anweisungen Ihres Arztes.

Wenn Sie eine größere Menge von Differin angewendet haben, als Sie sollten

Es wird kein schnelleres oder besseres Resultat erzielt, wenn das Produkt häufiger aufgetragen wird. Im Gegenteil, es können dann Rötungen sowie Abschälung auftreten.

Wenn Sie eine größere Menge von Differin haben angewendet, kontaktieren Sie sofort Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder das Antigiftzentrum (070/245.245).

Wenn Sie die Anwendung von Differin vergessen haben

Nehmen Sie nicht die doppelte Dosis ein, wenn Sie die vorherige Einnahme vergessen haben.

Wenn Sie weitere Fragen zur Anwendung des Arzneimittels haben, fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

4. WELCHE NEBENWIRKUNGEN SIND MÖGLICH?

Wie alle Arzneimittel kann Differin Nebenwirkungen haben, die aber nicht bei jedem auftreten müssen.

Differin kann an den Stellen, an denen Sie das Gel auftragen, die folgenden Nebenwirkungen hervorrufen:

Häufige Nebenwirkungen (treten bei weniger als 1 von 10 Patienten auf)

- trockene Haut
- Hautreizungen
- Brennen
- Rötung (Erythem)

Gelegentlich auftretende Nebenwirkungen (treten bei weniger als 1 von 100 Patienten auf)

- lokaler Hautausschlag (Kontaktdermatitis)
- Hautbeschwerden

- Sonnenbrand
- Juckreiz (Pruritus)
- Hautabschälung (Exfoliation)
- Aufflackern der Akne

Andere Nebenwirkungen sind: schmerzhaftes oder geschwollenes Haut und Reizung, Rötung, juckende oder geschwollene Augenlider.

Informieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker, wenn eine der aufgeführten Nebenwirkungen Sie erheblich beeinträchtigt oder Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Gebrauchsinformation angegeben sind.

5. WIE IST DIFFERIN AUFZUBEWAHREN?

Nicht über 25 °C lagern.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Sie dürfen das Arzneimittel nach dem auf dem Umkarton nach "EXP" angegebenen Verfalldatum nicht mehr anwenden. Das Verfalldatum bezieht sich auf den letzten Tag des Monats.

Das Arzneimittel darf nicht im Abwasser oder Haushaltsabfall entsorgt werden. Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen. Diese Maßnahme hilft die Umwelt zu schützen.

6. WEITERE INFORMATIONEN

Was Differin enthält

Der Wirkstoff ist: Adapalen 0,1%.

Die sonstigen Bestandteile sind:

Differin Creme: Cyclomethicon, Squalan, Methyl (D-glucopyranosid) sesquisteat, 20-methyl (D-glucopyranosid) sesquisteat-ether (20), Glycerol, Phenoxyethanol, Carbomer, Methyl-p-hydroxybenzoat, Natriumedetat, Propyl-p-hydroxybenzoat, Natriumhydroxid und gereinigtes Wasser.

Differin Gel: Carbomer, Propylenglycol, Poloxamer 182, Natriumedetat, Methyl-p-hydroxybenzoat, Phenoxyethanol, Natriumhydroxid und gereinigtes Wasser.

Wie Differin aussieht und Inhalt der Packung

Differin Creme: Creme. Tube mit 30 g oder 60 g.

Differin Gel: Gel. Tube mit 30 g oder 60 g.

Es werden möglicherweise nicht alle Packungsgrößen in den Verkehr gebracht.

Abgabeweise: Verschreibungspflichtig

Pharmazeutischer Unternehmer und Hersteller

n.v. Galderma Belgilux s.a.
Rijksweg 14
B-2870 PUURS
E-Mail: Info.be@galderma.com

Hersteller

Laboratoires Galderma
Zone Industrielle Montdésir
F-74540 Alby-sur-Chéran

Dieses Arzneimittel ist unter den folgenden Nummern zugelassen:

Differin[®] Creme: BE191256

Differin[®] Gel: BE177082

Diese Gebrauchsinformation wurde zuletzt genehmigt im 11/2010.