

Lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, denn sie enthält wichtige Informationen für Sie. Dieses Arzneimittel ist ohne Verschreibung erhältlich. Um einen bestmöglichen Behandlungserfolg zu erzielen, muss Aknemycin 2% Lösung zur Anwendung auf der Haut jedoch vorschriftsgemäß angewendet werden.

- Heben Sie die Packungsbeilage auf. Vielleicht möchten Sie diese später nochmals lesen.
- Fragen Sie Ihren Apotheker, wenn Sie weitere Informationen oder einen Rat benötigen.
- Wenn sich Ihre Symptome verschlimmern oder keine Besserung eintritt, müssen Sie auf jeden Fall einen Arzt aufsuchen.

Diese Packungsbeilage beinhaltet:

1. Was ist Aknemycin 2% Lösung zur Anwendung auf der Haut und wofür wird sie angewendet?
2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Aknemycin 2% Lösung zur Anwendung auf der Haut beachten?
3. Wie ist Aknemycin 2% Lösung zur Anwendung auf der Haut anzuwenden?
4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?
5. Wie ist Aknemycin 2% Lösung zur Anwendung auf der Haut aufzubewahren?
6. Weitere Angaben.

Aknemycin 2% Lösung zur Anwendung auf der Haut

Aknemycin 2% Lösung zur Anwendung auf der Haut enthält als arzneilich wirksamen Bestandteil 0,02 g Erythromycin pro Gramm.

Die sonstigen Bestandteile sind: Ethanol, Glycerol, Laurylpolyglycolphosphat und Polyvidon.

Zulassungsinhaber und Hersteller: Almirall Hermal GmbH – - D-21465 Reinbek - Deutschland

Auf Wunsch können Sie auch Kontakt aufnehmen mit:

Almirall N.V.
Medialaan 32 B4
B-1800 Vilvoorde
02/257 26 63

Zulassungsnummer: 3600 IE 1 F 7

1. Was ist Aknemycin 2% Lösung zur Anwendung auf der Haut und wofür wird sie angewendet?

- Aknemycin 2% Lösung zur Anwendung auf der Haut ist erhältlich in einem durchsichtigen oder braunen oder undurchsichtigen Applikatorfläschchen aus Glas mit Schraubverschluss mit 25 ml.
- Aknemycin 2% ist auch in Salbenform erhältlich.
- Die Lösung enthält Erythromycin, ein Antibiotikum (ein Makrolid-Antibiotikum) zur lokalen äußeren Anwendung gegen Akne.

- Wenden Sie Aknemycin Lösung bei entzündlichen Formen von Akne mit Papeln und Pusteln an.

2. Was müssen Sie vor der Anwendung von Aknemycin 2% Lösung zur Anwendung auf der Haut beachten?

Aknemycin 2% Lösung darf nicht angewendet werden,

- wenn Sie überempfindlich (allergisch) sind gegenüber Erythromycin, anderen gleichartigen Antibiotika (Makrolid-Antibiotika) oder einem der sonstigen Bestandteile von Aknemycin 2% Lösung.

Besondere Vorsicht bei der Anwendung von Aknemycin 2% Lösung ist erforderlich,

- wenn Aknemycin 2% Lösung mit Augen, Schleimhaut und beschädigter Haut in Kontakt kommt, spülen Sie mit reichlich Wasser;
- wenn Sie überempfindlich sind gegenüber anderen Makrolid-Antibiotika. Kreuzreaktionen sind möglich;
- Kreuzresistenz mit anderen Makroliden und mit Lincomycin und Clindamycin kann vorkommen;
- wenn keine Verbesserung eintritt. Ziehen Sie dann eine bakterielle Resistenz in Erwägung;
- wenn Sie noch andere Arzneimittel einnehmen, lesen Sie bitte auch die Rubrik „Bei Anwendung von Aknemycin 2% Lösung mit anderen Arzneimitteln“.

Bei Anwendung von Aknemycin 2% Lösung zusammen mit Nahrungsmitteln und Getränken

Nicht zutreffend.

Schwangerschaft

Bisher sind keine schädlichen Auswirkungen bei Anwendung während der Schwangerschaft bekannt.

Fragen Sie vor der Anwendung jeglicher Arzneimittel Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Stillzeit

Bisher sind keine schädlichen Auswirkungen bei Anwendung während der Stillzeit bekannt.

Fragen Sie vor der Anwendung jeglicher Arzneimittel Ihren Arzt oder Apotheker um Rat.

Verkehrstüchtigkeit und das Bedienen von Maschinen

Aknemycin 2% Lösung hat keinen Einfluss auf die Fähigkeit, ein Fahrzeug zu lenken oder Maschinen zu bedienen.

Wichtige Informationen über bestimmte sonstige Bestandteile von Aknemycin 2% Lösung

Aknemycin 2% Lösung darf nicht mit Oxidantien oder Wasser gemischt werden, da diese Erythromycin inaktivieren.

Bei Anwendung von Aknemycin 2% Lösung zur Anwendung auf der Haut mit anderen Arzneimitteln

Bitte informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie andere Arzneimittel anwenden bzw. vor kurzem angewendet haben, auch wenn es sich um nicht verschreibungspflichtige Arzneimittel handelt.

Die gleichzeitige Anwendung anderer lokaler Mittel bei Akne, insbesondere solcher, die die Schuppung fördern (u. a. Benzoylperoxid, Tretinoin), kann die Hautreizung verschlimmern.

3. Wie ist Aknemycin 2% Lösung zur Anwendung auf der Haut anzuwenden?

Falls vom Arzt nicht anders verordnet, wenden Sie das Arzneimittel genau nach dieser Anweisung an.

Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind.

Die Lösung wird zweimal täglich mit dem Applikatorfläschchen direkt auf die Haut aufgetragen.

Aknemycin 2% Lösung darf nicht in die Augen gelangen.

Wenn Sie die Anwendung von Aknemycin 2% Lösung vergessen haben

Nicht zutreffend.

Auswirkungen, wenn die Behandlung mit Aknemycin 2% Lösung abgebrochen wird

Nicht zutreffend.

Wenn Sie eine größere Menge von Aknemycin 2% Lösung angewendet haben, als Sie sollten

Wenn Sie zu viel Aknemycin 2% Lösung angewendet haben, benachrichtigen Sie umgehend Ihren Arzt, Ihren Apotheker oder die Giftnotrufzentrale (070/245.245).

Die verabreichte Erythromycindosis ist zu gering, um systemische Toxizität zu verursachen. 1 Flasche Aknemycin 2% Lösung enthält 23,125 g Alkohol.

4. Welche Nebenwirkungen sind möglich?

Wie alle Arzneimittel kann Aknemycin 2% Lösung Nebenwirkungen haben.

Trockene Haut, Rötung, Brennen und Juckreiz der Haut können auftreten. In diesem Fall ist eine Fortsetzung der Behandlung mit der weniger stark austrocknenden Aknemycin 2% Salbe angezeigt. Aknemycin 2% Lösung kann auch abwechselnd mit der Salbe aufgetragen werden.

Wenn Rötung oder Juckreiz schlimmer werden, müssen Sie sich an Ihren Arzt wenden.

Informieren Sie Ihren Arzt oder Apotheker, wenn Sie Nebenwirkungen bemerken, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind.

5. Wie ist Aknemycin 2% Lösung zur Anwendung auf der Haut aufzubewahren?

- Bewahren Sie Aknemycin außerhalb der Reichweite und der Sicht von Kindern auf.
- Nicht über 25°C lagern, in der Originalverpackung aufbewahren.

Verfalldatum: Sie dürfen Aknemycin nach dem unter „EXP“ auf der Flasche und dem Umkarton angegebenen Datum nicht mehr anwenden.

Dieses Datum bezeichnet immer den letzten Tag des aufgeführten Monats.

6. Weitere Angaben

Wenden Sie sich für alle Informationen bezüglich dieses Arzneimittels an Ihren Arzt oder Apotheker.

Nicht verschreibungspflichtig.

- A. Diese Packungsbeilage wurde zuletzt am Dezember 2007 überarbeitet.
- B. Das Datum der Zulassung dieser Packungsbeilage ist der 16/01/2008