

NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Amoxicilline Teva 750 mg comprimés dispersibles

Amoxicilline

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant de prendre ce médicament.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez d'autres questions, si vous avez un doute, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez jamais à quelqu'un d'autre, même en cas de symptômes identiques, cela pourrait lui être nocif.
- Si l'un des effets indésirables devient grave ou si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice :

1. Qu'est-ce que Amoxicilline Teva et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant de prendre Amoxicilline Teva
3. Comment prendre Amoxicilline Teva
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Amoxicilline Teva
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE Amoxicilline Teva ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE

Amoxicilline Teva est un antibiotique du groupe des pénicillines.

Amoxicilline Teva sous forme orale est indiqué dans le traitement des infections bactériennes causées par des micro-organismes sensibles à l'amoxicilline : infections des voies respiratoires supérieures, infections des voies respiratoires inférieures, infections des voies urogénitales, infections des voies digestives.

Amoxicilline Teva est également indiqué pour prévenir l'endocardite contagieuse lors des interventions chirurgicales ou à visée diagnostique.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT DE PRENDRE Amoxicilline Teva

Ne prenez jamais Amoxicilline Teva

- si vous êtes allergique (hypersensible) à l'amoxicilline, aux pénicillines et aux céphalosporines ou à l'un des autres composants contenus dans Amoxicilline Teva.
- en cas de mononucléose ou de leucémie lymphocytaire.

Faites attention avec Amoxicilline Teva

N'oubliez pas d'informer complètement votre médecin concernant tous vos problèmes de santé, surtout si vous avez déjà présenté des troubles de nature allergique (surtout à l'égard d'antibiotiques) ou si vous avez une altération de la fonction rénale.

On a rarement mentionné un allongement du temps de coagulation du sang chez des patients ayant pris de l'amoxicilline. Il faut donc être particulièrement prudent si l'on prend également des anticoagulants.

La présence de quantités élevées d'amoxicilline dans l'urine peut donner lieu à la précipitation de ce produit dans les voies urinaires. Il est conseillé de veiller à ce que le patient prenne une quantité suffisante de liquide (il doit boire beaucoup d'eau).

Si vous prenez déjà d'autres médicaments, veuillez lire également la rubrique "Prise d'autres médicaments".

Veuillez consulter votre médecin si l'une des mises en garde mentionnées ci-dessus est d'application pour vous ou si elle l'a été dans le passé.

Prise d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

On a décrit des interactions avec les médicaments suivants : tétracyclines et autres bactériostatiques anti-infectieux, allopurinol (médicament contre la goutte), probénécide, sulfasalazine (médicament contre les inflammations intestinales) et contraceptifs oraux.

Aliments et boissons

Sauf indication contraire du médecin, Amoxicilline Teva doit se prendre pendant le repas ou avec un peu de nourriture.

Grossesse et allaitement

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

L'amoxicilline peut être utilisée pendant la grossesse si les bénéfices sont supérieurs aux risques éventuels liés au traitement.

L'amoxicilline peut être utilisée pendant l'allaitement.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

La prise d'Amoxicilline Teva n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

3. COMMENT PRENDRE Amoxicilline Teva

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas de doute, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

Votre médecin vous prescrira la quantité adéquate d'Amoxicilline Teva, en fonction de votre cas personnel et il vous dira combien de temps vous devrez prendre ce médicament. N'arrêtez pas prématurément votre traitement.

DE MANIERE GENERALE :

ADULTES

Infections des voies respiratoires supérieures : 1 à 2 g par jour, à répartir en plusieurs prises.

Infections des voies respiratoires inférieures : 2 à 3 g par jour, à répartir en plusieurs prises.

Infections des voies digestives : 2 à 3 g par jour, à répartir en plusieurs prises.

Infections des voies urinaires : 1 à 3 g par jour, à répartir en plusieurs prises.

Urétrite à gonocoques chez l'homme/infections non compliquées des voies urinaires chez la femme : 3 g en une seule prise (avec 1 g de probénécide).

Prophylaxie de l'endocardite contagieuse : 3 g en une seule prise avant l'intervention.

ENFANTS

25 à 50 mg/kg de poids corporel par jour (à répartir en plusieurs prises).

Sauf indication contraire du médecin, Amoxicilline Teva doit se prendre pendant le repas ou avec un peu de nourriture.

Comprimés dispersibles :

Avaler les comprimés avec un peu d'eau ou les dissoudre au préalable dans un demi verre d'eau.

PERSONNES ÂGÉES ET PERSONNES AYANT UNE ALTERATION DE LA FONCTION RENALE

Les personnes âgées doivent suivre scrupuleusement les indications du médecin, qui adapte la dose quotidienne et l'intervalle entre les administrations, en fonction de leur cas personnel.

Si vous avez pris plus d'Amoxicilline Teva que vous n'auriez dû

Si vous avez pris trop d'Amoxicilline Teva, prenez immédiatement contact avec votre médecin votre pharmacien ou le Centre Anti-poison (070/245.245).

Pendant l'administration de doses élevées d'amoxicilline, il faut veiller à avoir une bonne hydratation afin de réduire le risque de cristallurie (présence de cristaux dans l'urine), ce qui peut donner lieu à une insuffisance rénale. La prise d'une dose trop élevée par voie orale peut provoquer des vomissements et une diarrhée. Consultez votre médecin.

Si vous oubliez de prendre Amoxicilline Teva

Prenez dès que possible la dose oubliée. Ne prenez pas de dose double pour compenser la dose que vous avez oublié de prendre.

Si vous arrêtez de prendre Amoxicilline Teva

Consultez toujours votre médecin si vous souhaitez arrêter le traitement.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, Amoxicilline Teva peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Les effets indésirables mentionnés ci-dessous peuvent survenir avec tous les médicaments du groupe des pénicillines ; vous devez donc consulter votre médecin en cas de :

- *Infections* : on a très rarement mentionné une infection de la peau ou des muqueuses, causée par un champignon (Candida).
- *Réactions allergiques* : on observe parfois une rougeur de la peau pendant le traitement (aux alentours du 5^{ème} jour) ; cette rougeur n'est pas sévère et disparaît à l'arrêt du traitement. Les autres effets indésirables sont très rares : urticaire, éruption cutanée étendue, difficultés respiratoires sous forme de crises d'asthme et de rhume des foins, irritation de la langue et de la bouche ; ces effets indésirables ne sont pas sévères et disparaissent à l'arrêt du traitement.
- *Affections gastro-intestinales* : quelques troubles digestifs peu importants : une sensation de lourdeur dans l'estomac et des nausées, parfois une diarrhée, peuvent survenir pendant le traitement. On a très rarement mentionné une coloration noire et un aspect villeux de la langue. Chez les enfants, on a très rarement mentionné une coloration des dents. Ces effets peuvent généralement disparaître grâce au brossage des dents.
- *Affections du foie et du sang* : on a mentionné des effets indésirables au niveau du sang et du foie (jaunisse).

- *Affections du rein* : on a très rarement signalé des effets indésirables au niveau des reins. Des cas de cristallurie (présence de cristaux dans l'urine), pouvant s'accompagner de problèmes au niveau des reins, survenaient rarement chez des patients ayant été traités par des doses élevées d'amoxicilline.
- *Affections neurologiques* : hyperactivité, vertiges et convulsions.

Si vous ressentez un des effets mentionnés comme grave ou si vous présentez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER Amoxicilline Teva

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

A conserver à température ambiante (15-25°C).

A conserver dans l'emballage extérieur d'origine, à l'abri de l'humidité.

Ne pas utiliser Amoxicilline Teva après la date de péremption mentionnée sur la boîte après "EXP". La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient Amoxicilline Teva

- La substance active est l'amoxicilline.
- Les autres composants sont :
 - *Amoxicilline Teva 750 mg Comprimés dispersibles* : Cellulose microcristalline – Hydroxypropylcellulose – Silice colloïdale anhydre – Stéarate de magnésium – Arôme abricot 501110 APO 551.

Qu'est-ce que Amoxicilline Teva et contenu de l'emballage extérieur

Comprimés dispersibles :

Emballage sous plaquettes thermoformées contenant 16 comprimés.

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et fabricant

Titulaire de l'autorisation de mise sur le marché

Teva Pharma Belgium N.V.

Laarstraat 16

B - 2610 Wilrijk

Fabricant

PENCEF PHARMA GmbH

Breitenbachstrasse 13

D-13509 Berlin

Allemagne

Numéro d'autorisation de mise sur le marché

Amoxicilline Teva 750 mg comprimés dispersibles : BE204477

Mode de délivrance

Sur prescription médicale.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est mars 2010.